



PANSEMENT ABSORBANT POSTOPÉRATOIRE

Lorsque vous quittez le bloc opératoire, un pansement absorbant postopératoire couvre votre plaie.

RÔLE DU PANSEMENT

Composé d'une bordure adhésive et de mousse, ce pansement a des fonctions importantes :

- il absorbe les écoulements;
- il est étanche aux micro-organismes extérieurs;
- il crée une barrière protectrice;
- il garde un milieu contrôlé pour favoriser la guérison;
- il épouse les mouvements de votre corps par sa flexibilité.



À LA MAISON

Vous devez surveiller le pansement tous les jours : l'écoulement ne doit pas le saturer au maximum. Il doit être contenu dans l'espace central sans toucher la bordure adhésive.

S'il y a trop d'écoulement et que le pansement est à changer, communiquez avec les infirmières du CLSC.


LA DOUCHE EST PERMISE SEULEMENT SI LE PANSEMENT EST BIEN ADHÉRENT.

QUAND ET COMMENT ENLEVER LE PANSEMENT ABSORBANT POSTOPÉRATOIRE (OPSITE® POST-OP VISIBLE)

Observez la saturation du pansement. S'il n'y a pas de progression de l'écoulement depuis au moins 48 heures, vous pouvez enlever vous-même le pansement.

Si vous préférez, ou si l'écoulement perdure, gardez le pansement en place jusqu'à votre visite au CLSC où l'infirmière retirera le pansement et les agrafes (maximum 10 jours).

1. Soulevez un coin du pansement.
2. Tirez doucement dans la direction opposée.
3. Relâchez.
4. Répétez ces étapes le long du bord du pansement, jusqu'à ce que
5. l'adhésif soit souple et que le pansement se retire facilement.
6. Jetez le pansement.



Ce pansement est fait d'alvéoles et a une pellicule transparente au pourtour.

QUAND ET COMMENT ENLEVER LE PANSEMENT ABSORBANT AVEC ARGENT (AQUACEL® AG SURGICAL)

Observez la saturation du pansement. Vous pouvez enlever vous-même le pansement le 7^e jour suivant votre chirurgie.

Si vous préférez, ou si l'écoulement perdure, gardez le pansement en place jusqu'à votre visite au CLSC où l'infirmière retirera le pansement et les agrafes (maximum 10 jours).

1. D'une main, exercez une légère pression au pourtour du pansement pour retenir la peau. Soulevez délicatement un côté du pansement avec l'autre main.
2. Étirez le pansement dans la direction opposée afin de briser le joint adhésif.
3. Faites le tour du pansement et utilisant la technique décrite ci-dessus, jusqu'à ce qu'il soit décollé.
4. Jetez le pansement.



Ce pansement est beige sans alvéoles (il est « plein »).

Appelez votre chirurgien ou présentez-vous à l'urgence :

- si vous faites de la température (plus de 38,5 °C);
- s'il y a une rougeur, de la chaleur ou une induration (durcissement) sur la plaie;
- s'il y a un écoulement malodorant;
- si vous ressentez une douleur aiguë au site de la plaie.

Des questions ou des doutes? Téléphonnez au 811 (Info-Santé, 24h/24 7j/7) ou appelez l'infirmière de votre CLSC.

Auteur

Équipe de stomathérapie
Direction des soins infirmiers

Révision et mise en page

Service des communications
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2023

santeestrie.qc.ca

Juin 2023 - 4-6-10585 (version française) | 4-6-10586 (version anglaise)