




# LE CATHÉTER CENTRAL INSÉRÉ PAR VOIE PÉRIPHÉRIQUE (CCIVP) OU PICC

On vient de vous installer un **C**athéter **C**entral **I**nséré par **V**oie **P**ériphérique (CCIVP ou PICC en anglais) dans votre bras. Vous trouverez, dans ce feuillet d'information, les précautions à prendre ainsi que la surveillance à effectuer à la maison.

Ce cathéter est utilisé pour administrer des médicaments intraveineux (antibiotiques, chimiothérapie ou produits colorants) ou en présence de veines difficiles.

Le cathéter peut demeurer en place plusieurs semaines, voire plusieurs mois tant qu'il est fonctionnel. Il vous évite de vous faire piquer à chaque traitement.



## À LA MAISON

### ENTRETIEN

Afin de prévenir les risques d'infection, votre pansement, la rallonge et ainsi que le bouchon au bout du cathéter seront changés au moins une fois par semaine par l'infirmière de votre CLSC.

Afin de maintenir la perméabilité et d'éviter que votre cathéter s'obstrue, vous ou l'infirmière du CLSC devez l'irriguer avec une solution saline :

- ✓ avant et après chaque administration de médicaments;
- ✓ une fois par semaine en l'absence de traitement.

### SOINS DE LA PLAIE/HYGIÈNE

Si vous constatez que votre pansement est sale, mouillé ou décollé, ne vous inquiétez pas. Appelez au CLSC afin que l'infirmière planifie avec vous votre changement de pansement.

Le pansement ne doit jamais être en contact avec l'eau. Si vous souhaitez prendre une douche ou un bain, vous devez recouvrir le pansement d'une pellicule de plastique (par ex. : Saran Wrap®) ou d'un sac de plastique.

### GESTION DE LA DOULEUR

L'inconfort au site d'insertion ou la douleur au bras diminuera graduellement au cours des deux jours suivant l'intervention. Vous pouvez prendre de l'acétaminophène (Tylenol®) ou de l'ibuprofène (Advil®) si vous ne faites pas de fièvre (ce qui pourrait indiquer qu'il y a infection).

Prenez votre température en cas de doute.

## EFFORT PHYSIQUES ET ACTIVITÉS

Durant la période où vous aurez votre cathéter :

- évitez les sports de contact et les activités qui sollicitent l'utilisation de votre bras (tennis, baseball, golf, etc.);
- ne vous baignez pas;
- ne levez pas de poids de plus de 4,5 kilogrammes (10 livres).

## SYMPTÔMES À SURVEILLER

Consultez si vous constatez les symptômes suivants :

- la peau autour du cathéter est chaude, rouge, enflée ou sensible;
- votre bras est douloureux, vous sentez des picotements de façon continue;
- apparition de la fièvre :
  - clientèle avec traitement de chimiothérapie (38 °C ou 100 °F) qui dure plus d'une heure OU 38,3 °C ou 101 °F et plus;
  - clientèle sans traitement de chimiothérapie (38,5 °C ou 101,3 °F et plus).
- vous avez de la difficulté à respirer;
- vous êtes étourdi;
- votre état s'aggrave ou ne s'améliore pas par rapport aux symptômes mentionnés.

## QUI CONSULTER ?



EN PREMIER, référez-vous à l'infirmière de votre CLSC.



ENSUITE SEULEMENT communiquez avec Info-Santé au 811.

OU



Présentez-vous à l'urgence du centre hospitalier le plus près de chez vous.

### Auteur

Équipe des infirmières cliniciennes en accès vasculaire  
819 346-1110  
Hôpital Fleurimont : poste 18217  
Hôtel-Dieu de Sherbrooke : poste 21425

### Révision et mise en page

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

© CIUSSS de l'Estrie – CHUS  
santeestrie.qc.ca

Juin 2022 – 1-6-72002 (version française) | 4-6-11442 (version anglaise)