

TRANSFUSION D'UN PRODUIT SANGUIN POUR UN USAGER COVID-19

AIDE-MÉMOIRE
COVID-19

Juillet 2020

EN ZONE CHAUDE ET EN ZONE TIÈDE



AVANT DE COMMANDER LE PRODUIT SANGUIN :

AVISEZ LA BANQUE DE SANG QUE LE PRODUIT SANGUIN EST DESTINÉ À UN RECEVEUR INFECTÉ PAR LA COVID-19 OU SUSPECTÉ DE L'ÊTRE ET **INSCRIVEZ** COVID-19 SUR LA REQUÊTE.

En contexte de protocole de transfusion massive (PTM), référez-vous à cette section pour la procédure à suivre.

PRÉPARATION DU PRODUIT SANGUIN PAR LA BANQUE DE SANG

La banque de sang emballe le produit sanguin dans un sac à fermeture à glissière.

1. Le sac est placé dans un deuxième sac dans lequel est glissé le bordereau d'émission de produit sanguin. Le bordereau se retrouve donc entre le premier et le deuxième sac.
2. La banque de sang appose l'étiquette sur le deuxième sac. **Le personnel infirmier complète l'information sur l'étiquette lors de la fin de la transfusion.**

- S.V.P ne pas jeter ce produit sanguin avant :
Date _____ Heure : _____
Conserver 6 heures post transfusion

VÉRIFICATIONS PRÉ-TRANSFUSIONNELLE EN ZONE CHAUDE ET EN ZONE TIÈDE

1. Retirez seulement le bordereau d'émission du sac.
2. Vérifiez la concordance entre l'ordonnance médicale, le bordereau et le produit sanguin.
3. Confiez le bordereau au 2^e vérificateur, qui reste à l'extérieur de la chambre, et apportez le produit sanguin, qui est toujours dans ses deux sacs, à l'intérieur de la chambre.
4. Retirez le sac externe et déposez-le de façon à pouvoir le réutiliser à la fin de la transfusion.
5. Vérifiez l'identité du receveur avec le bracelet et la concordance avec l'étiquette du produit sanguin. **La concordance avec le bordereau est faite de façon verbale avec le 2^e vérificateur qui est à l'extérieur de la chambre. Ce dernier remplit le bordereau et signe pour le transfuseur en indiquant « Au nom de ... ».**

TRANSFUSION

1. Retirez le produit sanguin du sac et effectuez la transfusion selon la méthode de soins habituelle.
2. Si le produit sanguin ne peut être transfusé, conservez celui-ci dans la chambre et appelez à la banque de sang pour connaître la procédure à suivre.

DISPOSITION DU PRODUIT SANGUIN VIDE

1. Remettez le produit sanguin vide dans le premier sac à fermeture à glissière.
2. Désinfectez l'extérieur du sac.
3. Placez le premier sac dans le deuxième sac qui comprend l'étiquette.
4. **Complétez l'information sur l'étiquette** qui est apposée sur le deuxième sac en inscrivant l'heure à laquelle l'infirmière pourra disposer du produit sanguin (**6 heures post transfusion**).
5. Conservez le produit sanguin accroché à la tige à soluté ayant servi à la transfusion pendant 6 heures post transfusion au cas où il y aurait une réaction transfusionnelle.
6. **Disposez du produit sanguin dans la poubelle de déchets biomédicaux sur l'unité de soins lorsque le 6 heures post transfusion aura été atteint.**

CONFIRMATION DE LA TRANSFUSION EN ZONE CHAUDE ET EN ZONE TIÈDE

1. Placez le bordereau d'émission de produit sanguin dans un sac à fermeture à glissière dont l'extérieur est désinfecté avant de le placer au dossier du receveur.
2. Placez le coupon de confirmation dans un sac à fermeture à glissière dont l'extérieur est désinfecté avant de l'acheminer à la banque de sang.
3. En cas de réaction transfusionnelle, retournez le produit sanguin transfusé dans le double sac à la banque de sang selon la procédure *Interventions lors d'une réaction transfusionnelle*.

EN SITUATION DE PTM

Dans la mesure du possible, ne jamais entrer la boîte de produits sanguins dans la chambre de l'utilisateur.

La boîte de produits sanguins et le chariot de transport peuvent entrer dans les zones chaudes et les zones tièdes. Si tel est le cas, **une désinfection des surfaces de contact extérieures du chariot ainsi que de la boîte de produits sanguins sera requise, et ce, avant de sortir de la zone chaude ou tiède.**