

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES N95/CONTACT/OCULAIRE

EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE

PRÉCAUTIONS pour le **PERSONNEL** et les **VISITEURS**

WARNING to STAFF and VISITORS

- | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| 1 |  | Hygiène des mains à l'entrée de la chambre | 5 |  | Visière ou écran facial |
| 2 |  | APR N95
Faites le test d'étanchéité | 6 |  | Matériel dédié ou désinfecté après usage |
| 3 |  | Blouse de protection à manches longues | 7 |  | Confinement de l'usager dans la chambre en tout temps |
| 4 |  | Gants | 8 |  | Porte ouverte (chambre), rideaux fermés (cubicule, aire ouverte) |

PRÉCAUTIONS à appliquer par **L'USAGER** avant de **SORTIR** de la **CHAMBRE**



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES N95/CONTACT/OCULAIRE

EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE

ADULTE/ENFANT

INDICATION

- MRSI (maladie respiratoire sévère infectieuse)

Matériel requis pour l'application des précautions

- Affiches « N95/CONTACT/OCULAIRE - intérieur de la chambre » et « N95/CONTACT/OCULAIRE - extérieur de la chambre »
- Support pour sacs à linge et déchets
- APR à haut pouvoir filtrant N95 pour le personnel (s'assurer que toutes les grandeurs soient disponibles)
- APR à haut pouvoir filtrant de type « bec de canard » pour les visiteurs et proches aidants
- Masque de procédure pour l'utilisateur, s'il doit sortir de la chambre
- Blouse de protection à manches longues
- Visière ou écran facial
- Gants
- Matériel dédié (thermomètre, stéthoscope, brassard, chaise bassine, etc.)
- Lingettes désinfectantes
- Chaise d'aisance dédiée si pas de toilettes dédiées

Hygiène et salubrité

- Désinfection « contact » ;
- Au transfert ou au départ de l'utilisateur ;
- À la fin des précautions additionnelles, même si l'utilisateur demeure dans sa chambre ;
- Aucun délai d'attente avant d'entrer dans la chambre après le départ de l'utilisateur ;
- Port des EPI gouttelettes/contact/oculaire pour la désinfection terminale de la chambre.

Particularités

- Chambre individuelle ou cubicule avec rideaux fermés (urgence ou aire commune, ex. : hémodialyse) ;
- Si l'utilisateur suspecté à risque faible est dans une chambre multiple : demeurer dans la chambre avec rideau fermé jusqu'à l'obtention du résultat ;
- Si l'utilisateur suspecté à risque élevé est dans une chambre multiple : transfert en chambre individuelle requis ;
- Retirer l'APR et la visière à l'extérieur de la chambre dans le SAS ou le corridor, ou port prolongé pour le regroupement des soins ;
- Aucun délai d'attente avant d'admettre un autre utilisateur ;
- Utiliser la technique double sac lors du prélèvement des spécimens de laboratoire (se référer à l'annexe de la technique du double sac dans le programme MRSI) ;
- Si cohorte suspectée : changer la blouse de protection et les gants entre chaque utilisateur ;
- Si cohorte confirmée : changer les gants entre chaque utilisateur ;
- Changer la blouse de protection si autres précautions additionnelles (SARM, ERV, DACD, etc.).