

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

AÉRIENNES | CONTACT | OCULAIRE

INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE

PRÉCAUTIONS pour le PERSONNEL et les VISITEURS

WARNING to STAFF and VISITORS

1



Portes fermées
en tout temps
(chambre et SAS)

6



Retirer la blouse

2



Retirer les gants

7



Hygiène des mains
à la sortie
de la chambre

3



Hygiène
des mains

8



Utiliser une lingette
désinfectante pour
toucher la poignée
de la porte. Sortir et
fermer la porte.

4



Retirer les
lunettes étanches
ou l'écran facial

9



Retirer le masque
à l'extérieur
de la chambre
dans le SAS, sinon
dans le corridor

5



Hygiène
des mains

10



Hygiène des mains

PRÉCAUTIONS à appliquer
par L'USAGER avant
de SORTIR de la CHAMBRE



PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

AÉRIENNES | CONTACT | OCULAIRE

INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE

ADULTE/ENFANT

INDICATION

- MRSI (maladie respiratoire sévère infectieuse)

Matériel requis pour l'application des précautions

- Affiches « AÉRIENNES | CONTACT | OCULAIRE - intérieur de la chambre » et « AÉRIENNES | CONTACT | OCULAIRE - extérieur de la chambre »
- Support pour sacs à linge et déchets
- Masque à haut pouvoir filtrant N95 pour le personnel (s'assurer que toutes les grandeurs de masques N95 soient disponibles)
- Masque à haut pouvoir filtrant de type « bec de canard » pour les visiteurs
- Masque de procédure pour l'utilisateur, s'il doit sortir de la chambre
- Blouse imperméable à manches longues
- Lunettes étanches ou écran facial
- Gants
- Matériel dédié (thermomètre, stéthoscope, brassard, chaise bassine, etc.)
- Lingettes désinfectantes

Hygiène et salubrité

- Désinfection « contact »
 - Au transfert ou au départ de l'utilisateur
 - À la fin des précautions additionnelles, même si l'utilisateur demeure dans sa chambre
- La désinfection de la chambre peut se faire pendant le délai d'attente avec le port de l'équipement de protection
- Chambre à pression négative : 35 minutes
- Autres chambres : 3 heures 30 minutes
- Utiliser la technique double sac lors du prélèvement des spécimens de laboratoire (se référer à l'annexe de la technique du double sac dans le programme MRSI)
- Chambre à pression négative
- Vérifier que la pression négative est fonctionnelle
- Garder les portes du SAS et de la chambre fermées en tout temps
- Ouvrir une seule porte à la fois afin de garder une pression adéquate
- Retirer le masque N95 à l'extérieur de la chambre (dans le SAS ou le corridor si pas de SAS)
- Délai d'attente avant d'admettre un autre usager
- Retirer le masque N95 à l'extérieur de la chambre (dans le SAS ou le corridor si pas de SAS)
- Utiliser la technique double sac lors du prélèvement des spécimens de laboratoire (se référer à l'annexe de la technique du double sac dans le programme MRSI)

Particularités