

## AIDE-MÉMOIRE

### Mise en place des mesures d'éclosion COVID

#### Courte et longue durée

Unité :

Chef de service :

Date mise en place des mesures :

Date prévue de fin :

Mesures préventives	
<b>Mesures pour l'unité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dépister</b> et mettre en place les précautions <b>N95-C</b> ou <b>AC</b> si <b>IMGA</b> si apparition de symptômes compatibles avec la COVID-19 chez les usagers (sauf usagers rétablis &lt; 60 jours);</li> <li>• Si l'usager est dans une chambre multiple ;               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Considérer les voisins de la chambre : <b>Contact étroit</b> et procéder à son isolement à l'espace-lit, rideaux fermés et maintien de la distanciation ;</li> </ul> </li> <li>• Favoriser la distanciation physique de 2 m :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec et entre les usagers ;</li> <li>• Entre les membres du personnel (salle de pause).</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port du masque de procédure obligatoire pour tous.</li> </ul>
	Limiter les <b>transferts</b> vers d'autres unités : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si inévitable, pour des raisons médicales, se référer à la section contact élargi.</li> <li>• Aviser le service ou l'installation receveur de l'éclosion en cours</li> </ul>
	Évaluer et encadrer les <b>activités de groupe</b> et des bénévoles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les directives seront modulées au besoin par le comité d'éclosion ;</li> </ul>
	Maintenir les <b>visites</b> en respectant les mesures PCI.
<b>Mesures de gestion de l'environnement</b>	Éviter ou suspendre tout <b>IMGA</b> autant que possible, selon avis médical :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se référer au palier d'intervention pour la gestion de l'environnement COVID.</li> </ul>

<p><b>Cas confirmés</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instaurer des précautions <b>N95-C ou AC si IMGA:</b></li> <li>• Durée des mesures : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maladie légère à modérée : 5 jours ;</li> <li>• Maladie sévère ou usager immunosupprimé : 21 jours ;</li> </ul> </li> <li>• Ne pas redépister ces usagers à moins d’avis médical.</li> </ul>
<p><b>Contact étroit usager</b></p>	<p><b>Précautions additionnelles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GC</b> pour une durée de 4 jours inclusivement (Port du N95 requis jusqu’à l’obtention du résultat négatif):</li> </ul> <p><b>Dépistages :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• J0 et PRN si développe des symptômes</li> </ul>
<p><b>Contact élargi usager</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Précautions additionnelles :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune</li> <li>• Si usager transfère sur une autre unité ou installation de courte durée: précautions <b>GC</b> pour une durée de 4 jours inclusivement</li> </ul> </li> <li>• <b>Dépistages :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun, sauf si développe des symptômes</li> <li>• Si usager transfère sur une autre unité ou installation : J0</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Mesures pour le personnel</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autosurveillance quotidienne des symptômes de façon proactive :</li> <li>• Si vous avez des symptômes à domicile ou pendant votre quart de travail aviser la liste de rappel, le chef de service ou la coordonnatrice et contacter la PRRBSST</li> <li>• Au besoin, se référer à l’algorithme décisionnel dans l’Intranet sous l’onglet <b>Algorithmes</b> ou au gestionnaire : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes#c10022">https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/covid-19-membres-de-la-communaute-interne/employes#c10022</a></li> </ul> </li> <li>• Contact étroit TdeS : Selon les consignes de la <b>PRRBSST</b>.</li> </ul>
<p><b>Fin d’éclosion</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’équipe de prévention des infections cessera les mesures d’éclosion mises en place 10 jours après le début des symptômes du dernier cas confirmé.</li> </ul>