

AIDE À LA DÉCISION - COVID-19 – Accueil ou admission de l'utilisateur : DÉPISTAGE ET IMGA


Aucun dépistage requis lors d'IMGA pour les usagers rétablis il y a moins de trois mois.

Suspecté ou confirmé COVID-19 :
Résultat + et non rétabli ou ayant des symptômes associés à la COVID-19

Exposition à risque :
Contact étroit d'un cas confirmé COVID-19, contact élargi (unité en éclosion)

Froid :
Aucun symptôme de la COVID-19, usager rétabli de la COVID-19 depuis moins de 3 mois

IMPORTANT Gestion des lits pour tout IMGA AO ou ACO
1 choix : chambre individuelle pression négative, lorsque n'est plus disponible
2 choix : chambre individuelle pression neutre, lorsque n'est plus disponible
3 choix : chambre multiple **excepté pour usager suspecté/confirmé COVID-19**



RÉSULTAT POSITIF confirmé* (suspecté également pour le laboratoire du sommeil)
MESURE ACO IMGA groupe 1 MESURE N95/C/O IMGA groupe 2 et pour tous les soins prodigués
MESURE ACO ou N95/C/O lorsque l'usager est en transport/intervention dans un service diagnostique

- Ne pas réutiliser le masque mais favoriser le port prolongé en continu pour la tournée des soins de plusieurs usagers/chambres confirmés
- Visière obligatoire pour tous les soins (IMGA ou non) en **ZONE CHAUDE** (jeter après pause et repas) et **TIÈDE**
- Pression négative, porte fermée. Si impossible, pression neutre, chambre privé. Attente pour entrer dans la pièce post IMGA sans EPI adapté:
 - Salle à pression négative : 35 min
 - Salle à pression neutre dans un secteur avec système de ventilation centrale : 3.5 heure
 - Sans système de ventilation centrale : 6 heures

RÉSULTAT NÉGATIF**

- Masque de procédure pour IMGA groupe 1 et 2
- **IMPORTANT :** Si usager avec exposition à risque mais négatif : Mesure N95CO et dépistage q72 heures par la suite si IMGA en continue
- Pression neutre, pas de délai d'attente post IMGA pour tous les usagers négatifs

¹L'Association des Pneumologues de la province de Québec recommande de cesser le traitement par pression positive chez les utilisateurs de longue date sans hypoxémie nocturne sévère, peu importe le statut COVID-19. Cette décision doit par contre relever de l'équipe médicale de l'usager