

# Annexe 1 — Outil de dépistage du risque infectieux

2023-08-01 | Version 11.0 — Modifications apportées en jaune

## OUTIL DE DÉPISTAGE DU RISQUE INFECTIEUX

CLINIQUES EXTERNES, HÉMODIALYSE, ONCOLOGIE, CENTRE DE PRÉLÈVEMENT ET CLINIQUES  
AMBULATOIRES

### PROCÉDURE DE COMPLÉTION

*Professionnels visés : employés assignés au triage*

#### **Prétriage téléphonique, si possible, mais non obligatoire chez l'utilisateur et son accompagnateur (voir section 3 pour les questions)**

- Évaluer le statut infectieux ;
- Évaluer la présence de symptômes compatibles à la COVID-19 (voir liste ci-dessous) ;
- Évaluer les critères d'exposition (contact).

#### **Consignes à appliquer à l'arrivée de l'utilisateur dans le milieu**

- Demander à l'utilisateur et son accompagnateur de se frictionner les mains pendant 20 secondes avec une solution hydroalcoolique.
- La durée d'isolement pour les usagers confirmés est de 10 jours et pour les exposés est de 5 jours en installation, malgré la diminution de la durée en communauté.

#### **Questions à poser à l'utilisateur**

Êtes-vous actuellement atteint de la COVID-19 ou en attente d'un résultat de la COVID-19, depuis les 21 derniers jours ?

Avez-vous au moins un des symptômes suivants :

##### **Enfants 0 mois — 5 ans**

- Fièvre (température **rectale** supérieure ou égale à 38,5 °C (101,3 °F)) ;
- Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer ;
- Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhées ET fièvre (température rectale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus) ;
- Mal de gorge **ET** fièvre (température rectale de 38,1°C (100,6°F) et plus) ;
- Nez qui coule ou congestion nasale de cause inconnue **ET** un autre symptôme ci-dessus.

##### **Enfants 6-17 ans et adultes de 18 ans et plus**

- Au moins un symptôme parmi les suivants :
  - Fièvre (température **buccale** supérieure ou égale à 38,1 °C (100,6 °F)) ;
  - Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût ;

- Toux récente ou aggravation d'une toux chronique ;
- Essoufflement ;
- Difficulté à respirer ;
- Mal de gorge ;
- **Ou deux des symptômes suivants :**
  - Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) ;
  - Perte d'appétit importante ;
  - Rhinorrhée ou congestion nasale de cause inconnue ;
  - Céphalée ;
  - Fatigue intense ;
  - Diarrhée ;
  - Douleur abdominale ;
  - Nausée ou vomissement.

Avez-vous eu un contact étroit (contact domiciliaire, voisin de chambre en installation) avec un cas confirmé ou avec un cas suspect en attente d'un test (cas suspect : personne symptomatique et ayant eu un contact étroit avec un cas confirmé) dans **les 7** derniers jours ?

Avez-vous été hospitalisé/hébergé sur une unité en éclosion dans les **7 derniers jours ?**

### **Conduite à tenir**

- **Si l'utilisateur a répondu « non » aux quatre questions précédentes**

- Poursuivre les activités régulières en maintenant l'hygiène des mains.

- **Si l'utilisateur a répondu « oui » à la question 1 ou 2**

Aviser la personne responsable de la clinique afin de vérifier la pertinence de maintenir le rendez-vous sinon reporter (la prise en charge est la même si l'utilisateur a un résultat de test rapide positif ou par PCR).

Si le rendez-vous est maintenu, diriger l'utilisateur dans une salle individuelle fermée. Les précautions N95/contact/oculaire (N95-CO) devront alors être appliquées. L'utilisateur doit porter un masque de procédure. Si IMGGA de groupe 1 est possible, les précautions aériennes/contact/oculaire (ACO) devront être appliquées et utiliser une salle à pression négative (si non-disponible, respecter le temps d'attente de 3h30).

S'assurer que l'utilisateur recevra toutes les informations afin d'être dépisté pour la COVID-19 ou l'aviser qu'il devra contacter la ligne info Coronavirus au 1 877 644-4545 afin de recevoir les indications à suivre.

Si l'utilisateur doit se diriger vers une salle d'attente, l'installer dans la zone réservée.

Au départ de l'utilisateur, enfiler des gants propres et désinfecter les surfaces de contact et le matériel de soins utilisé avec une lingette d'Oxivir.

Retirer les gants et se désinfecter les mains pendant 20 secondes avec la solution hydroalcoolique.

- **Si l'utilisateur a répondu « oui » aux questions 3 ou 4**

- A. Lui faire porter un masque de procédure pour sa consultation.

Aviser la personne responsable de la clinique afin de vérifier la pertinence de maintenir le rendez-vous sinon reporter.

Si le rendez-vous est maintenu, les précautions gouttelettes/contact devront alors être appliquées. L'utilisateur doit porter le masque de procédure.

Au départ de l'utilisateur, enfiler des gants propres et désinfecter les surfaces de contact et le matériel de soins utilisé avec une lingette d'*Oxivir*.

Retirer les EPI et se désinfecter les mains pendant 20 secondes avec la solution hydroalcoolique.

Mentionner à l'utilisateur qu'il serait pertinent pour son contact d'appeler à la ligne info Coronavirus au 1 877 644-4545 afin de recevoir les indications à suivre.