

Évaluation **SET-UP** préopératoire en contexte COVID

| Symptômes   | Exposition  | Test COVID  | Urgence<br>(Délais acceptable)                                   | Plan  |
|-------------|-------------|-------------|--|---|
| -           | -           | -           | Toutes   | Situation « <i>Triple Négatif</i> » : <b>Suivre Plan A</b>  |
|             |             | ?           | Toutes   | Risque faible de porteur asymptomatique : <b>Suivre Plan B</b>  |
| -           | +           | -           | Toutes   | Selon la PCI, ce patient sera en isolement 14j post-exposition<br>Les critères d'exposition sont définis conjointement avec la PCI et la Santé publique.<br>Risque modéré de porteur asymptomatique : <b>Suivre Plan C</b>  |
|             |             | ?           | < 12h  | Si impossible d'attendre le résultat du test COVID, COVID suspecté : <b>Suivre Plan D</b>   |
|             |             |             | > 12h  | Attendre le résultat du test COVID et réévaluer le <b>SET-UP</b>  |
| -           | ?           | Peu importe | Toutes   | Si possible, retarder la chirurgie afin d'obtenir une histoire et réévaluer le <b>SET-UP</b><br>Dans les rares cas où l'exposition sera inconnue, considérer celle-ci <b>POSITIVE</b>   |
| +           | -           | -           | Toutes   | Symptômes <b>expliqués entièrement</b> par un Diagnostic alternatif : <b>Suivre Plan B</b>  |
|             |             |             | < 24h  | Symptômes <b>NON expliqués entièrement</b> par un Diagnostic alternatif<br>Si le test COVID a été fait <b>moins de 24h</b> après le début des symptômes, il est possiblement un faux négatif.<br>Si impossible de répéter le test 24h après le début des symptômes : <b>Suivre Plan C***</b>  |
|             |             |             | > 24h  | Symptômes <b>NON expliqués entièrement</b> par un Diagnostic alternatif<br>Si le test COVID a été fait <b>plus de 24h</b> après le début des symptômes, le test est plus fiable : <b>Suivre Plan B***</b>   |
|             |             | ?           | < 12h  | Symptômes <b>expliqués entièrement</b> par un Diagnostic alternatif<br>Si impossible d'attendre le résultat du test COVID : <b>Suivre Plan C***</b>   |
|             |             |             | > 12h  | Symptômes <b>NON expliqués entièrement</b> par un Diagnostic alternatif<br>Si impossible d'attendre le résultat du test COVID, COVID suspecté : <b>Suivre Plan D</b>  |
|             |             |             |  | Attendre le résultat du test COVID et réévaluer le <b>SET-UP</b>  |
| +           | +           | -           | < 24h  | Si le test COVID a été fait <b>plus de 24h</b> après le début des symptômes, le test est plus fiable. Toutefois, l'exposition demeure : <b>Suivre Plan C</b><br>Si le test COVID a été fait <b>moins de 24h</b> après le début des symptômes, il est possiblement un faux négatif.<br>Si impossible de répéter le test 24h après le début des symptômes : <b>Suivre Plan D***</b> |
|             |             |             | > 24h  | Repousser la chirurgie<br>Répéter le Test COVID 24h après le début des symptômes et réévaluer le <b>SET-UP***</b>   |
|             |             | ?           | < 12h  | Si impossible d'attendre le résultat du test COVID, COVID suspecté : <b>Suivre Plan D</b>   |
|             |             | > 12h       | Attendre le résultat du test COVID et réévaluer le <b>SET-UP</b> |   |
| +           | ?           | Peu importe | Toutes   | Si possible, retarder la chirurgie afin d'obtenir une histoire et réévaluer le <b>SET-UP</b><br>Dans les rares cas où l'exposition sera inconnue, considérer celle-ci <b>POSITIVE</b>   |
| ?           | Peu importe | Peu importe | Toutes   | Si possible, retarder la chirurgie afin d'obtenir une histoire et réévaluer le <b>SET-UP</b><br>Dans les rares cas où les symptômes sont inconnus, considérer ceux-ci <b>POSITIFS</b>   |
| Peu importe | Peu importe | +           | Toutes   | COVID confirmé : <b>Suivre Plan D</b>   |