

OUTILS CLINIQUES
COVID-19
 CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Héματο-oncologie - Outil de dépistage du risque infectieux

2020-09-25 | Modifications apportées en jaune

Objet

■ **Professionnels visés**

→ Les employés travaillant dans le secteur hémato-oncologie assignés au triage

• **Secteurs, programmes ou services visés**

→ Hémato-oncologie

À appliquer à l'arrivée de l'usager suite au pré-triage téléphonique

| | | |
|--|---|---|
| <p>Consignes aux professionnels (les) assigné(e)s au triage :</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Demandez à l'usager de se frictionner les mains pendant 20 secondes avec une solution hydro-alcoolique; ➤ Demander à l'usager de mettre un masque de procédure qui couvre le nez et la bouche; ➤ Maintenir une distance de 2 mètres avec l'usager; ➤ Interdiction pour tous les visiteurs/accompagnateurs à moins qu'ils ne soient autorisés par l'AIC, l'infirmière de la clinique ou la chef de service; <p>Poser les questions suivantes à l'arrivée de l'usager avant qu'il ne soit dirigé vers la salle de traitement ou la salle de consultation. S'il est accompagné d'un visiteur, le questionnaire doit aussi être effectué pour ce dernier.</p> | |
| <p>Questions à poser à l'usager :</p> | <p>1. Êtes-vous en attente d'un résultat de test COVID-19 ou avez-vous été testé positif à la COVID-19?</p> | <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> |
| | <p>2. Présentez-vous un ou des symptômes suivants? Si symptômes chroniques : aucune mesure particulière, admettre en zone froide.</p> <p>Adultes : Toutes les personnes de 18 ans et plus présentant au moins un symptôme parmi les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fièvre (température buccale de 38 °C (100,4 °F) et plus ou de 37,8 °C (100,0 °F) et plus pour les personnes âgées) • Toux récente ou aggravation d'une toux chronique; | <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> |

- Perte soudaine de l'odorat sans obstruction nasale avec ou sans perte du goût.

Ou 2 des symptômes suivants :

- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique);
- Mal de tête;
- Fatigue intense;
- Perte d'appétit importante;
- Mal de gorge;
- Nausées (maux de cœur), vomissements ou diarrhées.

Est-ce que votre **enfant** présente un ou des symptômes suivants?
Si symptômes chroniques : aucune mesure particulière, admettre en zone froide.

Oui Non

Enfants 0-5 ans :

Tous les enfants de 0 à 5 ans présentant au moins un symptôme parmi les suivants :

- Fièvre (température rectale de 38,5 °C (101,3 °F) et plus);
- Une apparition ou aggravation de la toux, essoufflement ou difficulté à respirer.

Ou 2 des symptômes suivants :

- Nez qui coule, congestion nasale ou mal de gorge ET fièvre (température rectale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus);
- Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhées ET fièvre (température rectale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus).

Enfants 6-17 ans

Tous les enfants de 6 à 17 ans présentant au moins un symptôme parmi les suivants :

- Fièvre (température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) et plus);
- Perte du goût ou de l'odorat;
- Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté à respirer.

Ou 2 des symptômes suivants :

- Maux de ventre;
- Vomissements;
- Diarrhées;
- Mal de gorge;
- Nez qui coule ou congestion;
- Grande fatigue;
- Perte d'appétit importante;
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique).



| | | |
|--|--|---|
| Conduite à tenir : | 3. Avez-vous été en contact avec des gens suspectés ou ayant été testés positifs à la COVID-19 dans les 14 derniers jours? | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| | 4. Avez-vous voyagé à l'extérieur du pays dans les 14 derniers jours? | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| | 5. Avez-vous été hospitalisé dans les 14 derniers jours? Si oui, où (Hôpital et unité) ? _____ ➤ Valider avec le service de PCI si hospitalisé sur une unité en éclosion de COVID-19 = isolement en zone tiède. | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| <p>Si la réponse est « non » aux 5 questions précédentes, procédez comme ceci :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installez l'utilisateur en zone froide dans la salle de traitement ou dans la salle de consultation selon la raison de la visite. <p>Si la réponse est « oui » à la question 1 procédez comme ceci :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rediriger immédiatement l'utilisateur à la maison ou à l'urgence selon la situation. Aucun usager suspect ou positif à la COVID-19 ne doit se présenter au centre de chimiothérapie. <p>Si la réponse est « oui » à la question 2 procédez comme ceci : Faire patienter l'utilisateur aux endroits identifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'utilisateur est prévu pour un traitement de chimiothérapie ou pour les patients attendus en oncologie pédiatrique : aviser l'AIC à son poste téléphonique; • Si l'utilisateur est prévu pour une consultation médicale : aviser l'infirmière de la clinique externe à son poste téléphonique. <p>Un membre du personnel revêtu de l'ÉPI adéquat amènera l'utilisateur à la salle de d'examen en zone tiède avec un isolement gouttelettes/contact/oculaire (GCO);</p> <p>Demander une évaluation médicale pour déterminer si les symptômes sont reliés au traitement de chimiothérapie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si symptômes reliés à la chimiothérapie : admettre en zone tiède en GCO. Dépistage COVID-19 selon l'évaluation médicale; • Si symptômes suspects de COVID-19: reporter le traitement de chimiothérapie jusqu'à l'obtention de résultat négatif de COVID-19 et jusqu'à élimination de la suspicion. <p>Au départ de l'utilisateur, mettre l'ÉPI approprié et désinfecter la chaise de l'utilisateur avec une lingette d'Oxivir. Procéder ensuite à l'hygiène des mains.</p> | | |



Si la réponse est « oui » à la question 3 ou 4 ou 5 (usager considéré exposé à la COVID-19):

Faire patienter l'usager aux endroits identifiés :

- Si l'usager est prévu pour un traitement de chimiothérapie ou pour les patients attendus en oncologie pédiatrique : aviser l'AIC à son poste téléphonique;
- Un membre du personnel revêtu de l'ÉPI adéquat amènera l'usager à sa chaise de traitement en zone tiède avec un isolement GCO;
- Si l'usager est prévu pour une consultation médicale : aviser l'infirmière de la clinique externe à son poste téléphonique.
 - Un membre du personnel revêtu de l'ÉPI adéquat amènera à la salle d'examen en zone tiède avec un isolement GCO ou en zone tiède pédiatrique selon le cas.

Au départ de l'usager, mettre l'ÉPI approprié et désinfecter la chaise de l'usager avec une lingette d'Oxivir. Procéder ensuite à l'hygiène des mains



Approuvé par : Dr. Vincent Masse

Groupe de travail : Nancy Laperrière, conseillère en prévention et contrôle des infections, Marie-Ida Guay, conseillère en prévention et contrôle des infections

Date d'entrée en vigueur : 2020-09-29

Codification CIUSSSE (donnée par l'AA CGOC)

universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Estrie – Centre
hospitalier universitaire
de Sherbrooke

Québec 