

Nom de l'intervenant : _____		Numéro d'employé : _____		
Titre d'emploi : _____				
Nom du superviseur : _____		Titre d'emploi : _____		
Étapes	Pratique clinique # 1	Pratique clinique # 2	Pratique clinique # 3	
À cocher par l'évaluateur lorsque l'étape est observée et réussie		Date (AAAA/MM/JJ)		
Respecte les mesures d'asepsie lors de la préparation du matériel et de son plan de travail				
Étapes pré exécutoires				
Se présente				
Procède à l'identification sans équivoque de l'utilisateur (double identification)				
Vérifie les informations sur le formulaire de vaccination (évaluation complétée et consentement)				
Valide les caractéristiques du vaccin avec le formulaire (nom, présentation, apparence, posologie, intervalle entre les doses, mode de conservation, voie d'administration, date et heure de péremption)				
Explique la procédure à la personne ou à la famille (N.B. : obtenir de l'aide si l'utilisateur n'est pas en mesure de collaborer)				
Installe l'utilisateur dans une position confortable (permettre le relâchement du muscle sélectionné), favorable au soin et donnant libre accès au site d'injection				
Étapes exécutoires				
Procède à l'hygiène des mains				
Identifie le site d'injection du muscle deltoïde à l'aide de la technique du triangle inversé				
Désinfecte le site d'injection d'un mouvement circulaire avec un tampon d'alcool pendant 30 secondes en appliquant une friction				
Laisse sécher à l'air libre complètement sans essuyer, souffler ou agiter la main				
Tient la seringue de la main dominante et retire le bouchon protecteur de l'aiguille.				
Positionne la peau de façon appropriée : <ul style="list-style-type: none"> • Tendre fermement la peau entre l'index et le pouce • Pincer le muscle entre le pouce et l'index (pour l'utilisateur maigre ou cachectique). 				
Insère l'aiguille d'un geste ferme et rapide dans un angle de 90 degrés par rapport à la peau l'aiguille doit être insérée jusqu'à l'embase afin d'atteindre le muscle et relâche la peau				
Injecte rapidement le produit, sans aspirer au préalable.				
Attend quelques secondes après la fin de l'injection avant de retirer l'aiguille.				
Retire l'aiguille d'un mouvement rapide, en suivant l'angle d'introduction.				
Applique une pression sur le site d'injection avec la gaze				
Dispose de l'aiguille dans un bac biorisque.				
Applique un diachylon sur le site d'injection				
Étapes post exécutoires				
Procéder à l'hygiène des mains.				
Documente les informations nécessaires au formulaire de vaccination				
Initiales du superviseur				