

GRILLE D'ÉVALUATION POUR PRÉPARATION D'UN VACCIN AVEC RECONSTITUTION

Nom de l'intervenant : _____		Numéro d'employé : _____	
Titre d'emploi : _____			
Nom du superviseur : _____		Titre d'emploi : _____	
Étapes	Pratique clinique		
	# 1	# 2	# 3
À cocher par l'évaluateur lorsque l'étape est observée et réussie	Date (AAAA/MM/JJ)		
Étapes pré exécutoires			
Regroupe le matériel requis			
Étapes exécutoires			
Procéder à l'hygiène des mains			
Vérifier la limpidité, la coloration de la solution et la date d'expiration			
Étapes de reconstitution			
Respecte les mesures d'asepsie lors de la préparation du matériel			
Retire le capuchon de la fiole de diluant et désinfecte par friction l'opercule avec un tampon d'alcool pendant 15 secondes et laisse sécher librement.			
Aspire, dans la seringue, la même quantité d'air que le volume à extraire de la fiole de diluant demandé par le fabricant.			
Retire le capuchon de l'aiguille, introduit l'aiguille au centre de l'opercule et injecte la quantité d'air contenue dans la seringue.			
Prélève la quantité de diluant demandée par le fabricant en tirant doucement sur le piston et retire l'aiguille de la fiole et remet le capuchon sur l'aiguille.			
Retire le capuchon de la fiole du vaccin et désinfecte par friction l'opercule avec un tampon d'alcool pendant 15 secondes et laisse sécher librement.			
Retire le capuchon de l'aiguille, introduit l'aiguille au centre de l'opercule et injecte la quantité de diluant dans la fiole du vaccin			
Avant de retirer l'aiguille de la fiole du vaccin reconstitué, retire 1,8 ml d'air dans la seringue vide afin d'égaliser la pression dans la fiole.			
Retourne doucement la fiole du vaccin reconstitué 10 fois sur elle-même sans l'agiter			
Observe la qualité du vaccin reconstitué N.B. : Le vaccin reconstitué peut être blanchâtre, mais sans particules			
Étape du prélèvement du vaccin reconstitué			
Assemble la seringue et l'aiguille de prélèvement en respecte des mesures d'asepsie			
Désinfecte par friction l'opercule avec un tampon d'alcool pendant 15 secondes et laisse sécher librement.			
Retire le capuchon de l'aiguille, saisit la fiole de la main non dominante tout en tenant la seringue, le pouce sur le piston et retourne la fiole à l'envers. Prélève la quantité de produit immunisant requise en tirant délicatement sur le piston. Au besoin, élimine les bulles d'air adéquatement afin de ne pas perdre de quantité de vaccin.			
Retire l'aiguille de la fiole tout en respectant l'asepsie et remet le capuchon sur l'aiguille.			
Étapes post exécutoires			
Procède à l'hygiène des mains			
Identifie adéquatement la seringue du vaccin			
Conserver le vaccin préparé selon les procédures prévues par le PIQ et la santé publique			
Signature du superviseur et titre d'emploi			