


Algorithme décisionnel concernant l'identification de la méthode de dépistage de la COVID-19

⇒ Dans le cas où une personne refuserait un test par écouvillonnage, ce qui entraînerait son départ sans dépistage, l'accès au test par gargarisme pourra être admissible en respect aux contre-indications.

⇒ Dans le cas où une personne préférerait l'accès au test naso/oropharyngé, celui-ci doit être autorisé en l'absence de contre-indications.



Contre-indication ou non indication au test

Test oropharyngé/nasal ID NOW *

- Obstruction des voies nasales
- Épistaxis actif
- Chirurgie récente bouche/nez
- Laryngospasme (Stridor)
- Enfant 0-3 mois
- Symptômes > 7 jours
- Personne asymptomatique

Test naso/oropharyngé**

- Obstruction des voies nasales
- Épistaxis actif
- Chirurgie récente bouche/nez
- Laryngospasme (Stridor)
- Enfant 0-3 mois
- Thrombocytopénie
- Coagulopathie sévère

Gargarisme ***

- Enfant 0-6 ans
- Symptômes > 7 jours
- Atteintes cognitives ou physiques ou tout autre incapacité limitant l'exécution adéquate et sécuritaire
- △ Usager en milieu de soins (CH/CHSLD)
- △ Reprise de test si faible positif
- △ Test antigénique détecté (M23 M24)

ENSEMBLE
pour la
VIE

À JOUR LE 6 JUILLET 2021

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Estrie – Centre
hospitalier universitaire
de Sherbrooke

Québec