Centre de santé et de services sociaux
des Sources

ORDONNANCE COLLECTIVE

Titre de l'ordonnance :		N° de l'ordonnance :
LORS DE L'ABSENCE DE MÉDECIN À L'URGENCE : **Initier une intervention chez un usager présentant des DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES**		**OC-02 FU**
Référence à un protocole : Oui ☐ Non ☑	**Date de mise en vigueur :** **Juin 2004**	**Date de révision :** **Août 2010**
Professionnels habilités : Infirmières de l'urgence lors d'absence médicale.		
Secteurs(s) d'activité(s) visé(s) : Urgence.		
Groupe cible ou situation clinique visée : Usager se présentant à l'urgence avec des difficultés respiratoires.		
Activités réservées : ‣ Évaluer la condition physique d'une personne symptomatique de difficultés respiratoires. ‣ Initier des mesures thérapeutiques selon une ordonnance collective.		

INDICATION :

- Lors d'absence médicale à l'urgence, usager se présentant avec des difficultés respiratoires.

CONDITION D'INITIATION :

- Épisode de dyspnée avec ou sans : toux, wheezing, sibilance expiratoire, tirage intercostal, sensation de constriction due aux spasmes des bronches.

INTENTION THÉRAPEUTIQUE :

- Bien évaluer le degré d'urgence selon ABC et orienter l'usager vers les ressources appropriées.
- Maintenir au mieux sa fonction respiratoire.

CONTRE INDICATIONS :

- MPOC (maladies pulmonaires obstructives et constrictives) connue, oxygéno dépendant alors donner O_2 pour saturation entre 90-93% maximum.
- Si oxygéno dépendant ou en cas de doute viser 90-93% de saturation.

LIMITES/RÉFÉRENCES AU MÉDECIN :

- Référence à une autre urgence en transport ambulancier avec escorte infirmière.

DIRECTIVES/RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES :

- Signes vitaux au complet.
- Tête de lit à 45° et plus.
- Installer O_2 pour saturation plus grande ou égale à 95% sauf MPOC et oxygéno dépendant, donner O_2 pour saturation 90-93% maximum.
- Installer saturomètre en continu
- Installer moniteur cardiaque.
- Installer NaCl 0,9% I.V. à 30 ml/heure.
- Si usage connu de broncho-dilatateur, donner Salbutamol (Ventolin®) 5 mg et Ipratropium (Atrovent®) 500 mcg en nébulisation, puis Salbutamol (Ventolin®) 5 mg en nébulisation x 2 au besoin aux 20 minutes.
- Transfert ambulancier avec escorte infirmière vers un autre établissement et aviser le centre hospitalier receveur.

SOURCES :

PROCESSUS D'ÉLABORATION	
Rédigé par :	
Marie-Jeanne Martel, Conseillère clinique	Août 2010
Personnes consultées :	
Julie Labrecque, Inhalothérapeute	19 août 2010
Dr Jean-Guy Daniels, Chef médicale de l'urgence	Octobre 2010
Pierre Luc Trépanier, Chef d'unités de soins	Octobre 2010
PROCESSUS D'APPROBATION	
Approuvée par la DSI :	
Brigitte Langlois	Date
Approuvée par le CMDP :	
~~Dre Françoise Bilodeau~~	Date