Centre de santé et de services sociaux
des Sources

ORDONNANCE COLLECTIVE

Titre de l'ordonnance :		N° de l'ordonnance :
LORS DE L'ABSENCE DE MÉDECIN À L'URGENCE : **Initier une intervention chez un usager présentant une DOULEUR RÉTRO-STERNALE**		**OC-07 FU**
Référence à un protocole : Oui ☐ Non ☑	**Date de mise en vigueur :** **Juin 2004**	**Date de révision :** **Juillet 2010**
Professionnels habilités : Infirmières de l'urgence lors d'absence de médecin.		
Secteurs(s) d'activité(s) visé(s) : Urgence.		
Groupe cible ou situation clinique visée : Usager se présentant à l'urgence et répondant aux indications.		
Activités réservées : ‣ Évaluer la condition physique d'une personne symptomatique de douleurs rétro-sternales. ‣ Initier des mesures thérapeutiques selon une ordonnance collective. ‣ Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.		

INDICATION :

- Lors d'absence de médecin à l'urgence, un usager présentant des douleurs d'allure coronarienne.

CONDITION D'INITIATION :

- En l'absence de médecin à l'urgence, usager présentant des douleurs thoraciques.

INTENTION THÉRAPEUTIQUE :

- Favoriser le transfert le plus rapidement possible vers une autre urgence.

CONTRE INDICATION :

- Prise de sildénafil (Viagra) est une contre indication à la prise de nitroglycérine (Nitro).

LIMITES/RÉFÉRENCES AU MÉDECIN :

- Transfert ambulancier avec une escorte vers une autre urgence et aviser le centre hospitalier receveur.

DIRECTIVES/RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES :

1. Prendre les signes vitaux (température, tension artérielle, pouls, respiration, saturation).
2. Faire un électrocardiogramme si ne retarde pas le transfert
3. Donner O_2 5 litres/min par lunette nasale.
4. Installer un soluté de NaCl 0,9 % à 30 ml/heure.
5. ASA non enrobé 80 mg, 4 co per os stat, si aucune allergie. Si allergie donner clopidogrel (Plavix) 75 mg 4 co.
6. Installer le moniteur cardiaque.
7. Transfert ambulancier avec escorte infirmière et aviser le centre hospitalier receveur.

Si douleur d'allure coronarienne, on peut lui donner de la Nitro sublinguale 0,4 mg, 1 puff aux 5 minutes, maximum x 3.

Vérifier si :

- Prise de Viagra dans le dernier 24 heures, risque d'hypotension sévère possible (Viagra + Nitro).

- Si prise de sildénafil (Viagra) ou non soulagé par la Nitro prendre Morphine 5 mg SC ou IV. Répéter 3 mg SC ou IV aux 15 minutes au besoin x 2.

SOURCES :

- Monographie du Viagra, Nitro et Morphine.

PROCESSUS D'ÉLABORATION	
Rédigé par :	
Marie-Jeanne Martel, Conseillèere clinique	Août 2010
Personnes consultées :	
Nathalie Charest, Chef pharmacienne	Août 2010
Dr. Jean Guy Daniels, Chef médical de l'urgence	Octobre 2010
Pierre-Luc Trépanier, Chef d'unités de soins	Octobre 2010
PROCESSUS D'APPROBATION	
Approuvée par la DSI :	
Brigitte Langlois	Date
Approuvée par le CMDP :	
Identification de la personne	Date