ORDONNANCE COLLECTIVE

Centre de santé et de services sociaux du Granit

TITRE : **Initiation de la chimioprophylaxie lors d'une éclosion à l'influenza chez le personnel du Centre de Santé et services sociaux du Granit**	**OC-0021** **Page 1 sur 4**
Référence à un protocole : Oui □ Non □ PRM-0001 **à une technique : Oui □ Non □ _____**	**Remplace :** **Date de révision prévue : décembre 2011** **Date d'entrée en vigueur : 15 décembre 2005**
Professionnels visés par l'ordonnance et secteur(s) d'activités(s) : **Infirmière responsable de la prévention des infections** **Infirmière-chef de l'unité** **Assistante-infirmière, détentrice du poste**	
Groupe de personnes visées ou situation clinique visée : **Les employés du Centre de Santé et de Services sociaux du Granit nécessitant une chimioprophylaxie lors d'une éclosion d'influenza, c'est-à-dire les employés non vaccinés et ne présentant pas de symptômes de l'influenza. Se référer à l'organigramme des mesures spécifiques de contrôle lors d'une éclosion d'influenza en CHSLD (voir annexe).**	
Médecin répondant : **Le médecin de famille de l'employé ou le médecin de garde de l'unité visée**	

1. Indications :

Prévenir la propagation du virus de l'Influenza lorsqu'une unité répond à la définition d'une éclosion à ce virus.

2. Contre-indication au Tamiflu :

- réaction sévère au Tamiflu
- grossesse
- allaitement
- insuffisance rénale

3. Procédures

1) L'infirmière autorisée évalue le statut vaccinal (voir annexe).

2) L'infirmière autorisée offre le vaccin fluviral.

3) L'infirmière autorisée complète le questionnaire sur le Tamiflu (voir annexe).

4) L'infirmière autorisée remet à l'employé l'ordonnance collective à l'intention du pharmacien s'il n'y a pas de contre-indication au questionnaire (voir annexe).

5) L'infirmière réfère l'employé à son médecin (si non disponible au médecin de garde de l'unité visée) si l'employé est connu pour HTA ou diabète. Le médecin doit alors évaluer sa fonction rénale. Le médecin se réfère au tableau Tamiflu pour la prescription.

OSELTAMIVIR (TAMIFLU[R])

Présentation : Capsule de 75 mg.

Contre-indications :
- allergie à une des composantes du produit
- insuffisance rénale sévère (clairance de créatinine inférieure à 10 ml/min)
- grossesse
- clientèle pédiatrique (ordonnance individuelle)

Effets secondaires : Nausées, vomissements

Précautions : La posologie d'oseltamivir doit être ajustée selon la clairance de la créatinine (voir le tableau posologie)

Interactions médicamenteuses : Aucune connue.

Posologie : La posologie d'oseltamivir doit être ajustée selon la clairance de la créatinine :

CLAIRANCE DE LA CRÉATININE	POSOLOGIE EN PROPHYLAXIE (Durée : au moins 14 jours et jusqu'à 10 jours après le début des symptômes chez le dernier cas)
> 30 ml/min (fonction rénale normale)	75 mg par jour
10 – 30 ml/min	75 mg aux deux jours
< 10 ml/min	Contre-indiqué

PROCESSUS D'ÉLABORATION

Rédigé par :

Anne Boulet *Chef du département de pharmacie*	Date
Dre Suzanne Paquet *Chef du service de soins de longue durée*	Date

PROCESSUS DE CONSULTATION

Louise Lemay *Conseillère à la qualité des services et des soins infirmiers*	Date

PROCESSUS DE VALIDATION

Marie-Claude Brunelle *Directrice de la qualité des services et des soins infirmiers*	Date

PROCESSUS D'APPROBATION

Dr Bernard Gélinas *Président du CMDP*	Date