ORDONNANCE COLLECTIVE
A-1.26 GUIDE DE SOINS POUR CANULE ARTÉRIEL
A) IRRIGUER LA CANULE ARTÉRIELLE AVEC NACL 0.9% (SÉRUM PHYSIOLOGIQUE)

APPROBATION :	**DATE : 2007-01-19**
Président du CMDP	
Directrice DSCQSI	
RÉVISION :	**DATE :**
Président du CMDP	
Directrice DSCQSI	

Conditions prescrites	**Ordonnance médicale** **Surveillance à distance** **Selon la méthode de soins**
Clientèle visée	**Client porteur d'un canule artériel**
Personnel habileté	**Personnel infirmier et inhalothérapeute du CSSSM**

PROTOCOLE

Directives : Irriguer en permanence la canule artérielle selon la méthode de soins avec une solution Nacl 0.9% 500 ml.

Précautions :
- Vérifier la perméabilité de la canule régulièrement et après chaque prélèvement effectué par la canule artérielle.
- Le sac à pression doit garder une pression de 300 mmHg en tout temps ; c'est ce qui assure une perfusion constante et empêche la coagulation dans la canule.

Limites : Ne rien injecter par la voie artérielle

Alerte : Aviser le médecin en urgence si :
- Ischémie distale (douleur, pâleur, froideur, absence de pouls);
- Signes d'infection (douleur – rougeur – odeur - œdème – hyperthermie);
- Retrait accidentel de la canule artérielle.