



# IMPORTANT

Prenez note que la section directives a été modifiée et qu'une OPI sera à venir.

**ORDONNANCE COLLECTIVE**  
**A-1.33 PRÉPARATION MÉDICAMENTEUSE POUR LES PATIENTS DEVANT AVOIR UNE**  
**COLONOSCOPIE**

<b>APPROBATION :</b>	<b>DATE : 2022-06-29</b>
Président du CMDP - Dr Yves Arcand	
<u>Directrice DSCQSI</u>	
CHEF DU DÉPARTEMENT PHARMACIE - ARMELLE APTER	
<b>RÉVISION :</b>	<b>DATE : 2009-03-25</b>
Président du CMDP - Dr Yves Arcand	o <i>Yves Arcand</i>
Directrice DSCQSI - Angèle Dubé	o <i>Angèle Dubé</i>
Chef du département pharmacie Armelle Apter	o <i>Armelle Apter</i>

**Conditions prescrites** Selon ordonnance et protocole

**Condition locale** Personnel infirmier du CSSSM  
**Protocole**

**Indications :** Patient nécessitant une préparation en vue d'une colonoscopie.

**Contre-indications :** Hypersensibilité aux produits de la préparation.  
 La solution de Picosulfate de sodium (Picosalax , Picodan) serait contre-indiquée chez les patients avec Cler inférieure à 30 ml/min.

**Notes :** Le médecin doit vous préciser le type de préparation désirée.

**Directives:**

- La veille au matin de la coloscopie, préparer la solution de polyéthylène glycol 3350 et électrolytes (PEG) (Bi-Peglyte) comme suit :  
 Verser le contenu d'un sachet complet dans 1 litre d'eau. Agitez 2-3 minutes jusqu'à ce que la solution devienne claire et répéter cette étape avec le 2<sup>e</sup> sachet. Réfrigérez les 2 solutions pour améliorer le gout.
- L'après-midi donner les 3 comprimés de bisacodyl avec de l'eau vers 15 heures. Ne pas croquer ni écraser les comprimés.
- Vers 19 heures : Faire boire rapidement 1 verre de la première solution de PEG (environ 240 mL) ceci à tous les 10 minutes jusqu'à avoir administré le litre de solution (4 verres en tout). Des selles aqueuses devraient commencer dans l'heure suivante et des selles molles devraient continuer pendant 1 à 2 heures après avoir bu entièrement la solution.
- Le jour de la coloscopie, 4 heures avant l'examen faire boire les 4 verres du dernier litre de PEG, ceci en donnant 1 verre aux 10 minutes.

Préparation chez les patients avec facteurs de risque (diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale) : La veille de l'examen, l'après-midi, faire boire graduellement 3 litres de solution de polyéthylène glycol et électrolytes (« Peglyte », « Golitely »);

Le matin de l'examen, donner à boire 1 litre de solution de polyéthylène glycol 3350 et électrolytes (« Peglyte », « Golitely »),

**Précautions:** Il est recommandé d'assurer une bonne hydratation au patient, surtout chez celui qui reçoit le phosphate de sodium.