ORDONNANCE COLLECTIVE
C-1.04 APPLIQUER DES TECHNIQUES D'AÉROSOLTHÉRAPIE SANS PRESSION POSITIVE INSPIRATOIRE, SI DÉTRESSE RESPIRATOIRE

APPROBATION :	**DATE : 2007-01-19**
Président du CMDP	
Directrice DSCQSI	
RÉVISION :	**DATE :**
Président du CMDP	
Directrice DSCQSI	

Administrer un traitement de Salbutamol 1 mg/ml (2.5ml) en attendant la prescription médicale.

Conditions prescrites	**Selon protocole**
Clientèle visée	**Clientèle présentant des signes de détresse respiratoire en attendant l'attention d'un médecin.** **Clientèle hospitalisée (exclusion clientèle de l'urgence)**
Personnel habileté	**Personnel infirmier et Inhalothérapeutes du CSSSM**

PROTOCOLE

Indications : Client en détresse respiratoire soit présentant les signes clinique suivants :

- Tachypnée – Wheezing;
- Dyspnée - Sibilances HT à l'auscultation;
- Tirage.

Directives :

- Si inhalothérapeute n'est pas sur place, l'aviser puis
- Évaluation des signes vitaux
- Administration de salbutamol 1mg/ml (2.5ml)
- L'inhalothérapeute reste au chevet tout au long du traitement et discute avec l'infirmier(e) des antécédents du client et de l'état de santé actuel.
- Remet au médecin l'évaluation du client post traitement et refera une évaluation du client dans la même journée

Informations à consigner au dossier :

- Signes vitaux (pouls, respiration et saturation).
- Coloration du patient et signes cliniques.