Centre de santé et de services sociaux
de Memphrémagog

ORDONNANCE COLLECTIVE
C-1.15 PROCÉDER À LA VENTILATION PAR MASQUE ET AU MAINTIEN DES VOIES AÉRIENNES LIBRES

APPROBATION :		**DATE : 2007-01-19**
	Président du CMDP	
	Directrice DSCQSI	
RÉVISION :		**DATE :**
	Président du CMDP	
	Directrice DSCQSI	

Conditions prescrites	**Selon protocole**
Clientèle visée	**Clientèle hospitalisée du CSSSM ainsi que vivant à domicile sur le territoire de la MRC Memphrémagog.**
Personnel habileté	**Personnel infirmier et inhalothérapeute du CSSSM**

PROTOCOLE

But : Provoquer une respiration artificielle chez un client qui ne peut respirer de lui-même.

Indications :
- Client en détresse respiratoire, en pré code.
- Client en arrêt cardio- respiratoire.
- Client en narcose.

Contre-indications : Client pour lequel, un code de non réanimation a été inscrit au dossier

Directives :
- Choisir un masque de la bonne taille pour la figure de l'usage
- Si l'oxygène est disponible, brancher celui- ci au réanimateur manuel, le débit étant entre 12-15 L/minute
- Se placer à la tête du client pour visualiser les mouvement du thorax.
- Si les prothèses dentaires sont déplacées, tenter de les replacer, sinon les retirer.
- Introduire une canule oro- pharyngée pour favoriser le passage de l'air.
- Mouler le masque sur le visage du client, la pointe du triangle sur le nez et la base entre les lèvres inférieures et le menton.
- Mettre la tête du client en extension.
- Maintenir le masque bien en place avec la main dominante :
  - le pouce presse le masque au niveau de la racine du nez;
  - l'index presse au niveau du menton;
  - les autres doigts tirent le menton vers le haut et l'arrière;
  - l'étanchéité est assurée en exerçant une pression uniforme au centre du masque.

Directives (suite) :
- Comprimer le ballon lentement avec l'autre main avec une force suffisante pour distendre la cage thoracique et le laisser reprendre sa forme rapidement :
  - adultes : tous les 5 secondes;

	▪ enfants : tous les 3 secondes; ▪ bébés : tous les 1-2 secondes.
Précautions :	Surveiller les signes cliniques qui indiquent une ventilation efficace (donc auscultation).
Informations à consigner au dossier :	- Signes vitaux (pouls, respiration et saturation). - Coloration du patient et signes cliniques.