ORDONNANCE COLLECTIVE	Administration d'un diphenhydramine lors d'une réaction allergique légère locale	OCM-4
Référence à un protocole : ☐ oui ☒ non **Titre ou numéro :**	**Date de mise en vigueur :** Janvier 2008	**Dates de révision :** Mai 2010 Décembre 2012

Professionnelles habilitées à exécuter l'ordonnance :
Infirmières habilitées qui possèdent la formation, les connaissances et les compétences nécessaires.

Secteur(s) d'activités visé(s) : CLSC : ☒ Richmond ☒ Valcourt ☒ Windsor ☒ Urgence mineure

Tous les secteurs : Hébergement : ☒ Richmond ☒ Valcourt ☒ Windsor

Groupe de personnes visées ou la situation clinique visée :

- Personnes ayant reçu un vaccin ou un médicament depuis moins de 15 minutes;
- Personnes présentant une piqûre d'insecte et symptômes associés.

Activités réservées :

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance;
- Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, y compris le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance;
- Administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance;
- Observer l'état de conscience d'une personne et surveiller les signes neurologiques.

Indications et conditions d'initiation

- Personne ayant reçu un vaccin depuis moins de 15 minutes;
- Personne présentant une réaction allergique légère locale : réaction cutanée prurigineuse, rougeur stable, unique au site de l'injection. ***En cas de réaction sévère, se référer à l'ordonnance collective concernant l'administration de l'adrénaline** *(voir OCM-3)*;
- Personne présentant une piqûre d'insecte et symptômes associés : œdème au pourtour du site de la piqûre, prurit/réaction locale;
- Nouvelle médication *(suite aux interventions, aviser le médecin concerné de la réaction allergique)*.

Intention thérapeutique

Soulagement des symptômes allergiques entraînés par la libération d'histamine.

⚠ Contre-indications

- Allergie ou hypersensibilité au médicament;
- Crises aiguës d'asthme;
- Nouveau-né/prématuré;
- Grossesse;
- Allaitement;
- Utilisation d'anesthésique en injection.

Précautions

- Hypersensibilité à la diphenhydramine;
- MPOC sévère;
- Patient déjà somnolent;
- Glaucome aigu à angle fermé;
- Maladies hépatiques graves : hépatite, cirrhose;
- Insuffisance rénale grave;
- Obstruction vésical *(hypertrophie prostate, néo prostate...)*;
- Obstruction du pylore et du duodénum;
- Patient sous traitement d'inhibiteur de la monoamine-oxydase;
- Troubles convulsifs;
- Patient à risque de chute *(diminution psychomoteur, diminution vigilance, utilisation certains médicaments...)*.

Limites / références au médecin

- S'assurer qu'il n'y a pas de signes d'une réaction systémique, tels que : œdème, éruptions urticariennes et prurit généralisé, troubles respiratoires et/ou circulatoires.
- Mettre en garde contre la consommation d'autres dépresseurs du système nerveux central tels Gravol, Atarax, etc.
- Référer au médecin s'il s'agit d'un enfant de moins d'un an.

Directives

- S'il s'agit d'une piqûre d'insecte, et que le dard est visible, le retirer.
- Administrer le Benadryl®, **une dose seulement** *(voir fiche technique – Annexe)*.
  - **Adultes** : 50 mg per os, une dose
  - **Adultes ne pouvant prendre de médication per os** :

    50 mg intramusculaire en une dose *(injection lente)*.
  - **Enfants** :

12 ans et plus :	25 à 50 mg per os, une dose
6 à 12 ans :	12,5 à 25 mg, une dose
2 à 5 ans :	(6,25 mg = 5 ml) 5 ml, une dose
moins de 2 ans :	(6,25 mg = 5 ml) 2,5 ml, une dose
- Appliquer sur la région atteinte une serviette humide froide pendant 15 à 20 minutes et poursuivre l'observation auprès de l'usager.

Sources

- CSSS de l'Ouest-de-l'Île.
- Guide d'application de la loi sur les actes médicaux autorisés en établissement, Association des médecins de CLSC du Québec, novembre 2002.
- Association des pharmaciens du Canada (2012). Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, version en ligne (e-CPS).

PROCESSUS D'ÉLABORATION

	Nom	Titre	Date
Rédigé par	Marielle Lehoux-Brisson	Directrice des soins infirmiers	Septembre 2007
Personnes consultées	Joanne Roy	Conseillère clinique, services de santé courants	Août 2009
	Daniel Boislard	Chef d'administration de programmes services généraux	Août 2009
	Dre Chantal Brien	Médecin, mission CLSC	Novembre 2007
	Dr Christian Gaouette	Médecin, Urgence mineure	Janvier 2008

INSTANCES CONSULTÉES

☒ **CECII**	☐ **CMDP**	☒ **Comité exécutif du CMDP**
☒ **CIIA**	☐ **CECM**	☒ **Autres (Préciser) :** **DSP**

PROCESSUS D'APPROBATION

Approuvé par : Signature :		13-06-05
Titre :	Président du CMDP	Date
Signature :		2013-06-12
Titre :	Directrice des soins infirmiers et des services de santé courants	Date

PROCESSUS DE RÉVISION

	Nom	Titre	Date
Révisé par	Julie Laflamme	Candidate infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne	Août 2012
Personnes consultées	Lyne Cardinal	Directrice des soins infirmiers et des services de santé courants	Août 2012
	Dr Serge Éthier	Omnipraticien	Août 2012

Janvier 2008
Rév. : Mai 2010, Décembre 2012

FICHE TECHNIQUE : BENADRYL

Nom générique Nom commercial	Diphenhydramine, chlorhydrate de diphenhydramine Benadryl
Classification	Antihistaminique
Mode d'action	Bloquer ou réduire la libération d'histamine
Dose Injectable : 60 mg/ml Médicament liquide : 5 ml = 6,25 mg Formule junior à croquer : 12,5 mg Caplet rose : 25 mg Capsule : 50 mg	 Adultes : 25 à 50 mg per os ou intramusculaire, une dose. Enfants 12 ans et plus : 25 à 50 mg per os, une dose Enfants : 6 à 12 ans : 12,5 à 25 mg, une dose 2 à 5 ans : (6,25 mg = 5 ml) 5 ml, une dose moins de 2 ans : (6,25 mg = 5 ml) 2,5 ml, une dose
Voie d'administration orale	Sirop, tablette, caplet ou capsule
Délai d'action	Environ 1 heure
Durée d'action	4 à 6 heures
Effets secondaires	Étourdissements, sécheresse de la bouche, trouble de vision, somnolence ou excitation paradoxale, nervosité. En aviser l'usager.