

ORDONNANCE COLLECTIVE ADMINISTRER UNE MÉDICATION : « DIMENHYDRINATE » (GRAVOL) PER OS

APPROUVÉ PAR :	
	Président du conseil d'administration
	Dr Michel Brouillet, Dre Françoise Gendron et Dre Thérèse Ostiguy
	Groupe des médecins de Val-du-Lac
DATE : 2008-05-29	
DATE DE RÉVISION	:

Activité réservée :

Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance (article 36, al.2, par.11).

Date de rédaction :

Juillet 2006.

Référence à un protocole ou des procédures :

Non

Personne habilitée à exécuter l'ordonnance :

L'infirmière habilitée du Service de santé du Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac.

Groupe de personnes visé ou la situation clinique visée par l'ordonnance :

Les jeunes hébergés au Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac, et les jeunes des foyers de groupe Envol et Kelly.

Indications:

Traitement symptomatique des nausées et ou des vomissements sans douleur abdominale aiguë.

Intention thérapeutique:

Administrer une médication « dimenhydrinate » (Gravol) pour soulager les nausées, les vomissements chez le jeune.

Précautions et directives applicables :

- 1. Faire l'évaluation des symptômes : durée, nombre et type de vomissements ou de selles liquides, présence de sang, fièvre ou frissons, d'anorexie, douleurs abdominales, association avec un IVRS d'allure virale.
- 2. S'enquérir du questionnaire épidémiologique : contact infectieux, voyage récent, prise d'antibiotique, nouvelle médication, aliments suspects, etc.
- 3. Rechercher des signes et symptômes de déshydratation : (muqueuses sèches, pli cutané, yeux cernés, diminution du volume des urines, modification de l'état de conscience).
- 4. Prendre les signes vitaux et peser le jeune.
- 5. L'acétaminophène peut être utilisé en présence de fièvre ou de douleurs, selon l'ordonnance collective #6.
- 6. Si les vomissements compromettent l'absorption per os, utiliser la voie rectale.
- 7. Réévaluer le jeune selon l'évolution.

Référer à un médecin si :

- Contre indications.
- Douleur abdominale aiguë.
- > Symptômes persistant plus de 48 à 72 heures.
- > Présence de sang dans les vomissements, les diarrhées.
- > Atteinte de l'état général ou de l'état de conscience.

Contre-indications:

Hypersensibilité connue à ce médicament;

Limites (précautions):

- > Interaction médicamenteuse possible avec les anti-psychotiques atypiques et les
- ➤ Augmentation des effets anti-cholinergiques ⇒ somnolence, bouche sèche, étourdissement.

Posologie:

- > Gravol: 1 à 1.5mg/kg/dose, aux 6 heures au besoin, per os ou par voie rectale
- > 5mg/kg/24 h : maximum 300mg / 24 heures.

Principaux effets secondaires (manifestations cliniques):

Sécheresse de la bouche, somnolence, étourdissements.