

ADDDOINE DAD .

# ORDONNANCE COLLECTIVE APPLIQUER UNE MÉDICATION TOPIQUE: « HYDROCORTISONE » (CORTATE)

| AII ROOVE I AR .         |   |
|--------------------------|---|
|                          | Président du conseil d'administration                             |
|                          | Dr Michel Brouillet, Dre Françoise Gendron et Dre Thérèse Ostiguy |
|                          | Groupe des médecins de Val-du-Lac                                 |
| <b>DATE</b> : 2008-05-29 |   |
| DATE DE RÉVISION         | <b>:</b>  |

#### Activité réservée :

Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance (article 36, al.2, par.11).

#### Date de rédaction :

Juillet 2006.

## Référence à un protocole ou des procédures :

Non

#### Personne habilitée à exécuter l'ordonnance :

L'infirmière habilitée du Service de santé du Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac.

## Groupe de personnes visé ou la situation clinique visée par l'ordonnance :

Les jeunes hébergés au Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac, et les jeunes des foyers de groupe Envol et Kelly.

#### Indications:

- > Rougeurs, démangeaisons ou éruptions provoquées par l'eczéma, dermatite causée par du savon, des bijoux...
- Présence d'une dermatose où il y a des signes inflammatoires.

## Intention thérapeutique:

> Appliquer une substance médicamenteuse « hydrocortisone » (cortate) pour le soulagement temporaire des irritations bénignes de la peau et des démangeaisons de la peau.

## Précautions et directives applicables :

Évaluation du jeune : signes et symptômes cliniques

#### Référer à un médecin si :

- S'il y a des signes d'infection (rougeur, œdème, chaleur, douleur ou écoulement).
  Ou
- > Si les lésions persistent au-delà de 7 jours ou s'îls réapparaissent après l'interruption du traitement topique.

### **Contre-indications:**

- > Hypersensibilité à l'un des constituants du produit.
- > Infection cutanée.

## Limites (précautions):

Nil

# Posologie:

- > Appliquer Cortate (hydrocortisone 0.5 % en crème) en couche mince sur la peau, 3 à 4 fois par jour.
- > Ne pas prolonger le traitement plus de 7 jours.
- > Privilégier une crème hydratante.

## Principaux effets secondaires (manifestations cliniques):

Nil