Centre jeunesse
de l'Estrie

NUMÉRO 17

ORDONNANCE COLLECTIVE
INITIER DES MESURES DIAGNOSTIQUES : CULTURE DE GORGE

APPROUVÉ PAR :

Président du conseil d'administration

Dr Michel Brouillet, Dre Françoise Gendron et Dre Thérèse Ostiguy

Groupe des médecins de Val-du-Lac

DATE : 2008-05-29

DATE DE RÉVISION : _____

Activité réservée :

- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance (article 36, al. 2, par. 3)

Date de rédaction :

Juillet 2006.

Référence à un protocole ou des procédures :

Non

Personne habilitée à exécuter l'ordonnance :

L'infirmière habilitée du Service de santé du Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac.

Groupe de personnes visé ou la situation clinique visée par l'ordonnance :

Les jeunes hébergés au Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac, et les jeunes des foyers de groupe Envol et Kelly.

Indications :

Faire une culture de gorge chez les jeunes symptomatiques de mal de gorge.

Intention thérapeutique :

Éliminer une infection à streptocoque Bêta hémolytique du groupe A, dans un contexte de prévention du RAA.

Précautions et directives applicables :

1. Évaluation du jeune : signes et symptômes cliniques (symptômes d'infection des voies respiratoires supérieures).
2. Prendre les signes vitaux (température, etc.).
3. Culture de gorge si répond aux critères subjectifs. Voir tableau ci-joint.
4. La culture de gorge est acheminée au laboratoire dans la journée et gardée à la température de la pièce.

SCORE DES SYMPTÔMES POUR LE DIAGNOSTIC DE LA PHARYNGO-AMYGDALITE À STREPTOCOQUE B-HÉMOLYTIQUE DU GROUPE A

Score de mal de gorge	
Température>38°	1 point
Absence de toux	1 point
Exsudats blanchâtres	1 point
Ganglions douloureux	1 point
Âge 3-4 ans	1 point
Âge 15-44 ans	0 point
Âge 45 ans et plus	-1 point

Score de mal de gorge	
0 à 1 point	• Pas de culture ni antibiotiques. • Mesure de base seulement.
2 à 3 points	• Culture de gorge. • Antibiotique seulement si résultat positif.
4 points et +	• Traitement antibiotique sans culture préalable.

« référence : solution nursing formation en rôle élargi »

Référer à un médecin si :

➢ Dès la réception de la culture de gorge positive pour du streptocoque Bêta hémolytique du groupe A.

Contre-indications :

Nil

Limites (précautions) :

Nil

Posologie :

Nil

Principaux effets secondaires (manifestations cliniques) :

Nil