Centre jeunesse
de l'Estrie

NUMÉRO 18

ORDONNANCE COLLECTIVE
INITIER DES MESURES DIAGNOSTIQUES : CULTURE VAGINALE

APPROUVÉ PAR :

Président du conseil d'administration

Dr Michel Brouillet, Dre Françoise Gendron et Dre Thérèse Ostiguy

Groupe des médecins de Val-du-Lac

DATE : 2008-05-29

DATE DE RÉVISION : _____

Activité réservée :

- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance (article 36, al. 2, par. 3)

Date de rédaction :

Juillet 2006.

Référence à un protocole ou des procédures :

Non

Personne habilitée à exécuter l'ordonnance :

L'infirmière habilitée du Service de santé du Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac.

Groupe de personnes visé ou la situation clinique visée par l'ordonnance :

Les jeunes hébergés au Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac, et les jeunes des foyers de groupe Envol.

Indications :

Chez les jeunes filles avec symptômes d'infection vaginale.

Intention thérapeutique :

Éliminer une infection vaginale.

Précautions et directives applicables :

- Évaluation de la jeune : signes et symptômes cliniques.
- Symptômes vaginaux (état des leucorrhées, odeurs, prurit).
- Douleurs abdominales, fièvre, signes vitaux.
- Symptômes urinaires.
- Présence d'irritants locaux.
- Évaluer les risques d'ITS.
- Examen clinique :
    - signes vitaux
    - prélèvement vaginal
    - test pH sur sécrétions vaginales et test au KOH.
    - Analyse et culture urinaire si besoin (voir ordonnance collective #14).
    - Dépistage ITS si besoin.
- La culture est acheminée au laboratoire dans la journée et gardée à la température de la pièce.

Référer à un médecin si :

- Dès réception des résultats positifs
- Si lésions vulvaires
- Symptômes d'ITS (urétrite, infection pelvienne).
- Symptômes vaginaux incommodants.

Contre-indications :

Nil

Limites (précautions) :

Nil

Posologie :

Nil

Principaux effets secondaires (manifestations cliniques) :

Nil