Centre jeunesse
de l'Estrie

NUMÉRO 19

ORDONNANCE COLLECTIVE
INITIER DES MESURES DIAGNOSTIQUES : TEST DE GROSSESSE

APPROUVÉ PAR :	
	Président du conseil d'administration Dr Michel Brouillet, Dre Françoise Gendron et Dre Thérèse Ostiguy
	Groupe des médecins de Val-du-Lac
DATE : 2008-05-29	
DATE DE RÉVISION : _____	

Activité réservée :

- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance (article 36 al.2, par.3).

Date de rédaction :

Juillet 2006.

Référence à un protocole ou des procédures :

Non

Personne habilitée à exécuter l'ordonnance :

L'infirmière habilitée du Service de santé du Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac.

Groupe de personnes visé ou la situation clinique visée par l'ordonnance :

Les filles hébergées au Centre jeunesse de l'Estrie et au Foyer l'Envol, en âge de procréer.

Indications :

- Retard menstruel;
- Menstruations anormales;
- Douleurs abdominales.

Intention thérapeutique :

Confirmation de grossesse ou non.

Précautions et directives applicables :

- Faire l'évaluation des symptômes (DDM, durée du cycle, saignement anormal, douleur abdominale, dernier coït, utilisation ou non de contraception...)
- Exécuter le test selon la procédure du fabricant.
- Remettre le résultat à la jeune.

REMISE DU RAPPORT

Si le test est positif :

- Discuter avec la jeune concernant son choix. Si elle est ambivalente, assurer un suivi et/ou la référer au service adéquat (ex. : éducateur responsable, ARH de la clinique de planification des naissances, médecin).
- Si elle désire une interruption volontaire de grossesse (IVG), la référer à la clinique de planification des naissances (CPN) de Sherbrooke.
- Pré IVG médical et suivi post IVG à Val-du-Lac si suivi par un médecin du service de santé et selon sa disponibilité.
- Si elle désire poursuivre la grossesse, la référer à un médecin.

Si test est négatif :

- Discuter du désir de grossesse et de la contraception.
- Prévoir un suivi et un contrôle du test si besoin.

Référer à un médecin si :

- Test positif et douleur abdominale
- Test négatif et aménorrhée, menstruation anormale ou douleur abdominale.

Contre-indications :

Nil

Limites (précautions) :

Nil

Posologie :

Nil

Principaux effets secondaires (manifestations cliniques) :

Nil