NUMÉRO 2

Centre jeunesse
de l'Estrie

ORDONNANCE COLLECTIVE
ADMINISTRER UNE MÉDICATION :
« DIPHENHYDRAMINE » (BENADRYL) PER OS

APPROUVÉ PAR :

Président du conseil d'administration

Dr Michel Brouillet, Dre Françoise Gendron et Dre Thérèse Ostiguy

Groupe des médecins de Val-du-Lac

DATE : 2008-05-29

DATE DE RÉVISION : _____

Activité réservée :

Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance (article 36, al.2, par.11).

Date de rédaction :

Juillet 2006.

Référence à un protocole ou des procédures :

Non

Personne habilitée à exécuter l'ordonnance :

L'infirmière habilitée du Service de santé du Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac.

Groupe de personnes visé ou la situation clinique visée par l'ordonnance :

Les jeunes hébergés au Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac, et les jeunes des foyers de groupe Envol et Kelly.

Indications :

- Rash lors d'une réaction allergique mais sans anaphylaxie.
- Réaction locale de piqûres d'insectes (œdème local, prurit).

Intention thérapeutique :

Administrer une médication « diphenhydramine » (benadryl) per os pour soulager des symptômes cutanés d'allergie.

Précautions et directives applicables :

Rédigé par Renée Lemieux, infirmière B. Sc. Inf. et Marielle Bibeau MD.
Inspiré des documents du CLSC de Sherbrooke et
de l'Association des Médecins de CLSC du Québec.

- Évaluation du jeune : signes et symptômes cliniques (recherche de symptômes systémiques : œdème laryngé, dyspnée).
  - Référence : Ordonnance collective #1.
- Prendre les signes vitaux
- Faire une ré-évaluation clinique post prise du Benadryl.
- Possibilité d'appliquer de la glace localement.

Référer à un médecin si :

- Symptômes non soulagés ou persistants après 24 heures.

Contre-indications :

- Hypersensibilité connue à ce médicament.

Limites (précautions) :

- Mise en garde contre la consommation d'autres dépresseurs du système nerveux central (ex. : Gravol, sirop antitussif, etc...) qui peuvent augmenter les effets anticholinergiques.

Posologie :

- Benadryl :
  - 5mg / kg / 24 heures (aux 6 à 8 heures).
  - 1,25mg à 1,50mg / kg / dose (3 à 4 fois par jour).

Poids	**Sirop 12.5mg / 5ml**	**Comprimés de 25mg**
16 à 20kg	24mg = 10ml	1 co
21 à 25kg	31.5mg = 12.5ml	1 co
26 à 30kg	39mg = 15ml	1 co
31 kg et plus	46.25mg = 20ml	2 co

Principaux effets secondaires (manifestations cliniques) :

- Sécheresse de la bouche.
- Étourdissements.
- Vision trouble.
- Somnolence.