

# ORDONNANCE COLLECTIVE APPLIQUER DES SUBSTANCES DANS LE TRAITEMENT DES VERRUES

APPROUVÉ PAR :	
	Président du conseil d'administration
	Dr Michel Brouillet, Dre Françoise Gendron et Dre Thérèse Ostiguy
	Groupe des médecins de Val-du-Lac
<b>DATE</b> : 2008-05-29	
DATE DE RÉVISION	•

#### Activité réservée :

> Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance (article 36, al. 2, par. 3)

#### Date de rédaction :

Juillet 2006.

#### Référence à un protocole ou des procédures :

Non

## Personne habilitée à exécuter l'ordonnance :

L'infirmière habilitée du Service de santé du Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac.

# Groupe de personnes visé ou la situation clinique visée par l'ordonnance :

Les jeunes hébergés au Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac, et les jeunes des foyers de groupe Envol et Kelly.

#### Indications:

> Traitement des verrues.

#### Intention thérapeutique:

> Traiter les jeunes porteurs de verrues.

#### Précautions et directives applicables :

- Évaluation du jeune : signes et symptômes cliniques.
- Fréquence des traitements : aux 2 à 3 semaines.

#### Référer à un médecin si :

- > Pour le diagnostic.
- > Contre-indications.
- Après cinq traitements si lésions non guéries.

#### Contre-indications:

- Hypersensibilité au produit.
- > Cryothérapie : phénomène de Raynaud.
- > Canthacur: grossesse.

# Limites (précautions)

Diabète

## Posologie:

- 1. Cryothérapie (Histofreezer)
  - Appliquer sur la lésion de 20 à 40 secondes, selon la tolérance.
  - Effectuer de 1 à 2 cycles « gel-dégel ».
- 2. Canthacur (0.7 % de cantharidine)

Canthacur PS (1.0 % de cantharidine, 30 % d'acide salicylique, 5 % de podophyline)

- Ne pas utiliser sur une peau irritée.
- Appliquer sur la verrue et au pourtour (1 à 3 mm).
- Appliquer de la Vaseline au pourtour.
- Couvrir avec un ruban adhésif non-poreux en plastique.
- Garder le tout minimalement 4 heures.

N.B.: Les verrues plantaires de type mosaïque, les verrues kyperkératosiques et périunguéales sont souvent résistantes à la cryothérapie. Dans ces cas, la cantharidine peut devenir le traitement de choix.

# Principaux effets secondaires (manifestations cliniques):

- > Irritation;
- Douleur locale.