

# ORDONNANCE COLLECTIVE ADMINISTRER UNE MÉDICATION : « SALBUTAMOL » (VENTOLIN)

APPROUVÉ PAR :	
	Président du conseil d'administration
	Dr Michel Brouillet, Dre Françoise Gendron et Dre Thérèse Ostiguy
	Groupe des médecins de Val-du-Lac
<b>DATE</b> : 2008-05-29	
DATE DE RÉVISION	<b>:</b>

## Activité réservée :

Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance (article 36, al.2, par.11).

#### Date de rédaction :

Juillet 2006.

# Référence à un protocole ou des procédures :

Non

# Personne habilitée à exécuter l'ordonnance :

L'infirmière habilitée du Service de santé du Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac.

# Groupe de personnes visé ou la situation clinique visée par l'ordonnance :

Les jeunes hébergés au Centre jeunesse de l'Estrie, Val-du-Lac, et les jeunes des foyers de groupe Envol et Kelly.

## Indications:

Jeune déjà connu asthmatique, présentant des signes et symptômes d'une crise d'asthme sévère.

# Intention thérapeutique:

Administrer une médication « salbutamol » (ventolin) pour soulager ou contrôler une crise d'asthme.

## Précautions et directives applicables :

- Evaluation du jeune : signes et symptômes cliniques.
- > Prendre les signes vitaux.
- > DEP (débit expiratoire de pointe).

#### Crise d'asthme sévère :

- Dyspnée.
- > Wheezing audible.
- > Cyanose.
- > Tirage intercostal.
- > Expiration prolongée et laborieuse.
- > Altération de l'état de conscience.

#### Référer au médecin si :

Présence sur place et appeler l'ambulance.

#### Contre-indications:

> Hypersensibilité connue à ce médicament.

## Limites (précautions):

- Suspicion d'obstruction des voies aériennes supérieures avec corps étranger.
- > Arythmie cardiaque.

## Posologie:

- > Utiliser l'aérosol doseur 100 mcg de Ventolin avec un aérochambre :
  - Enfant moins de 10 ans : 1 inhalation (100mcg / 2 kg), q. 30-60 secondes, maximum 10 inhalations.
  - Plus de 10 ans : 1 inhalation, q. 30-60 secondes, maximum 10 inhalations.
  - **N.B.**: répéter si pas de réponse après 15-20 minutes.
- > Si non-réponse au Ventolin après deux traitements à intervalle de 15 à 20 minutes:
  - adrénaline 1:1000 0.01cc/kg (max 0,5cc). Voir ordonnance collective #1.

### Principaux effets secondaires (manifestations cliniques):

- > Tremblements.
- > Palpitations.
- > Nervosité.