ORDONNANCE COLLECTIVE	Initier et administrer un laxatif lors de constipation	DSI-OC-14
Référence à un protocole ☑ **oui** ☐ **non** Élimination intestinale	**Date de mise en vigueur :** 2009	**Date de révision :** 2012
Professionnelles habilitées à exécuter l'ordonnance et secteur(s) d'activité(s) visé(s) : Infirmières habilitées possédant la formation, les connaissances et les compétences nécessaires. **Secteur(s) d'activités(s) visé(s) :** ☐ CLSC: ☑ Hébergement		
Groupe de personnes visées ou la situation clinique visée : • Toute clientèle hébergée en CHSLD qui présente de la constipation		
Activités réservées s'adressant aux infirmières : • Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique • Initier une mesure thérapeutique selon une ordonnance • Administrer et ajuster des médicaments lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance		

Intention thérapeutique :

- Soulager la constipation

Indications et condition d'initiation :

- Constipation (si aucune, selle après 24 heures) chez un résident du CHSLD

Contre-indications :

- Douleur abdominale aiguë,
- Diarrhée, vomissements
- Allergie, intolérance ou hypersensibilité au lait de magnésie
- Saignements gastro-intestinaux
- Chirurgie rectale, abdominale ou urinaire récente

Limites/ référence au médecin :

- Ne pas administrer de lait de magnésie en même temps que Fosamax, Actonel, Cipro ou Avelox
- Si utilisation de l'ordonnance de plus de 3 fois par mois
- Si l'ordonnance collective est inefficace

Directives :

- **Voir le protocole ''Élimination intestinale à l'annexe 1.**

Références aux méthodes de soins :

- AQESSS, Méthodes de soins infirmiers, méthodes 5.4

Source :

- CSSS de Memphrémagog, ordonnance collective No A-1.18 E)

ANNEXE 1

PROTOCOLE D'ÉLIMINATION INTESTINALE

	ÉTAPE	TRAITEMENT
2ieme journée sans selle	**1**	Débuter la médication PRN prescrite s'il y a lieu
3ieme journée sans selle	**2**	Lait de magnésie 15 ml HS Donner la médication habituelle contre la constipation.
4ieme journée sans selle	**3**	**-Faire un toucher rectal** : ➢ ***Si absence de fécalome*** a) Suppositoire glycérine I.R le matin du 4 e jour **Si non efficace** b) Suppositoire de dulcolax I.R 4 à 6 heures après suppositoire de glycerine **Si non efficace** c) lavement Fleet à l'eau, 4 heures après suppositoire de dulcolax ➢ ***Si présence de fécalome*** a) lavement Fleet huileux avec tube rectal **Si non efficace après une heure**, b) procéder à un fractionnement ou une extraction manuelle (curage rectal) c) Répéter par la suite, si nécessaire, un lavement Fleet huileux jusqu'à évacuation du fécalome
5ieme jour sans selle	**4**	Administrer un lavement Fleet à l'eau le 5e jour sans selle

Par la suite, si selle normale ou molle : donner la médication contre la constipation

En tout temps :

- **Évaluer et encourager l'hydratation : 1.5 litre si aucune restriction**
- **Évaluer l'alimentation et apporter les correctifs nécessaires**
- **Évaluer et favoriser l'activité**

À la suite d'une selle diarrhéique (vraiment liquide) en bonne quantité, ne pas donner la médication prescrite.

PROCESSUS D'ÉLABORATION

Rédigé par : Lucie Desrosiers, adjointe à la Direction des soins infirmiers **Avec la collaboration de :**	

PERSONNES ET INSTANCES CONSULTÉES

☑ **CECII** ☑ **CMDP** ☑ **DSP** ☐ **CIIA** ☐ **CM**	

PROCESSUS D'APPROBATION

Approuvé par : Denis Payeur Directeur des soins infirmiers H Payeur Adopté par le CMDP	2009/03/12 Date 2009/03/12 Date