Centre de santé et de services sociaux
du Haut-Saint-François

ORDONNANCE COLLECTIVE	Initier et administrer de la NITROGLYCÉRINE lors de DOULEURS RÉTROSTERNALES	DSI-OC-18
Référence à un protocole ☐ **oui** ☑ **non**	**Date de mise en vigueur :** 2009	**Date de révision :** 2012
Professionnelles habilitées à exécuter l'ordonnance et secteur(s) d'activité(s) visé(s) : Infirmières habilitées possédant la formation, les connaissances et les compétences nécessaires. **Secteur(s) d'activités(s) visé(s) :** ☑ CLSC: Programme Services courants ☑ Hébergement		
Groupe de personnes visées ou la situation clinique visée : • Toute clientèle adulte qui présente des douleurs rétrosternales serratives		
Activités réservées s'adressant aux infirmières : • Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique • Initier une mesure thérapeutique selon une ordonnance • Administrer et ajuster des médicaments lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance		

Intention thérapeutique :

- Soulager rapidement les douleurs rétrosternales serratives

Indications et condition d'initiation :

- Crises aiguës d'angine (douleurs rétrosternales serratives)
- Une douleur débutant ou s'étendant au cou, à la mâchoire, à la gorge, à l'épaule, au dos ou au(x) bras;
- Un malaise dans le cou ou le haut du dos, particulièrement entre les omoplates;
- Un engourdissement ou une perte de sensation dans les bras, les épaules ou les poignets.

Contre-indications :

- Allergie, intolérance ou hypersensibilité à la nyrtroglycérine
- Absence de pouls radial
- Tension artérielle systolique < 100 mm Hg
- Utilisation de Sildénafil (Viagra) ou Tadalafil (Cialis) ou Vardefamil (Lévitra) ou autre médicament de cette classe

Limites/ référence au médecin :

- Référer au médecin si non soulagé après 20 minutes ou 3 doses consécutives de nitroglycérine

- Si pression systolique diminue à 100 mm Hg , cesser l'administration de Nitro, mettre en "Trendelenburg"

Directives :

- Faire coucher la client

- Évaluer la DRS selon le PQRST

- En CLSC , faire ECG stat et faire lire par le médecin sur place

- Administrer O_2 3 L/ min. (lunette)

- **Administrer une dose de 0,4 mg de nitroglycérine en pulvérisation par voie SL ou intra-buccale dès l'apparition des douleurs rétrosternales puis à toutes les 5 minutes, jusqu'à disparition des symptômes ou un maximum de 3 doses en pulvérisation**

- Vérifier la tension artérielle, le pouls et la respiration avant et après chaque administration de la nitroglycérine

- Aviser le client des effets secondaires possibles : céphalées, étourdissements, hypotension

Références aux méthodes de soins :

- AQESSS, Méthodes de soins infirmiers, méthodes 5.1.4 et 5.4

Source :

- CSSS de Memphrémagog, ordonnance collective No A-1.18.B) janvier 2007

PROCESSUS D'ÉLABORATION

Rédigé par : Lucie Desrosiers, adjointe à la Direction des soins infirmiers **Avec la collaboration de :**	

PERSONNES ET INSTANCES CONSULTÉES

☑ **CECII** ☑ **CMDP** ☑ **DSP** ☐ **CIIA** ☐ **CM**	

PROCESSUS D'APPROBATION

Approuvé par : Denis Payeur Directeur des soins infirmiers H Payeur Adopté par le CMDP	2009/03/12 Date 2009/03/12 Date