

Fiche de signalement de surdose pour les cliniciens

Transmettre à la Direction de santé publique de l'Estrie par **télécopieur au 819 564-5435 (confidentiel)**

ou par courriel à sante-environnementale.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

et hors heures ouvrables, faites le 819 346-1110 poste 0 et demander à parler au médecin de garde en santé environnementale

IDENTIFICATION DU DÉCLARANT	NATURE DU SIGNALEMENT
Nom : _____ Téléphone : _____ Direction / Service : _____ Date d'obtention des informations : _____	<input type="checkbox"/> Surdose sévère (ex. : administration de naloxone, intubation, soins intensifs, hospitalisation, décès, etc.) <input type="checkbox"/> Effets inhabituels (ex. : somnolence après consommation de stimulants) <input type="checkbox"/> Évènement inhabituel (ex. : agrégat de surdoses, milieu festif, nouvelle substance)

IDENTIFICATION DE LA VICTIME DE LA SURDOSE (UNE FICHE PAR PERSONNE)
Nom : _____ Prénom : _____ DDN : _____ Sexe : <input type="checkbox"/> Homme <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Autre RAMQ : _____ Informations obtenues auprès de : <input type="checkbox"/> Victime de la surdose <input type="checkbox"/> Témoin de la surdose <input type="checkbox"/> Autre : _____

DESCRIPTION DE L'ÉVÈNEMENT
Date : _____ Heure : _____ Quartier : _____ Lieu : <input type="checkbox"/> Résidence privée <input type="checkbox"/> Lieu public intérieur <input type="checkbox"/> Lieu public extérieur <input type="checkbox"/> Lieu dédié à la consommation <input type="checkbox"/> Autre : _____ Combien de personnes ont consommé cette (ces) substance(s) en même temps? : _____ Combien de ces personnes ont fait une surdose? : _____ * Compléter une fiche par personne

DESCRIPTION DES SUBSTANCES CONSOMMÉES			
Substance(s) et forme (ex. cocaïne en poudre)	Mode de consommation (fumé/prisé/injecté/oral/autre)	Quartier d'achat	Substance disponible pour analyse (O/N)

INFORMATIONS CLINIQUES
Symptômes à l'arrivée : <input type="checkbox"/> Détresse respiratoire <input type="checkbox"/> Myosis (pupilles contractées) <input type="checkbox"/> Lèvres bleues <input type="checkbox"/> Sudation excessive <input type="checkbox"/> Hyperthermie <input type="checkbox"/> Palpitations cardiaques <input type="checkbox"/> Autres : _____ Administration de naloxone avant l'arrivée à l'hôpital : <input type="checkbox"/> Par Urgence-santé <input type="checkbox"/> Par un proche <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne sais pas Administration de naloxone à l'hôpital : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Commentaires : _____ Prélèvement envoyé au CTQ pour analyse toxicologique à des fins de vigie (voir procédure à la 2^e page) : <input type="checkbox"/> Urine (1 ^{er} choix) <input type="checkbox"/> Sanguin Trousse de naloxone remise au patient : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Commentaires : _____ État actuel : <input type="checkbox"/> Congé <input type="checkbox"/> Observation <input type="checkbox"/> Soins intensifs <input type="checkbox"/> Refus de traitement <input type="checkbox"/> Décès

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Prélèvement d'échantillon lors de surdoses de drogues pour analyse toxicologique au Centre de toxicologie du Québec (CTQ)

En situation de surdose sévère, d'effets inhabituels lié à la consommation ou de tout évènement inhabituel, prélever un échantillon et l'envoyer au CTQ pour analyse toxicologique. Le rapport de toxicologie parviendra au directeur de santé publique après quelques semaines et contribuera à la vigie. Des appels à la vigilance peuvent résulter de cette vigie afin que les consommateurs soient informés des risques.

À noter que le résultat « opioïde : négatif » du dépistage fait à l'hôpital n'exclut pas la présence de fentanyl, de carfentanil, d'isotonitazène ou de certains autres opioïdes de synthèse. **Si le clinicien a besoin d'un test qualitatif détectant le fentanyl en urgence pour soigner son patient, celui-ci doit appeler au Centre antipoison du Québec au (1-800-463-5060). Ce dernier organisera l'envoi d'un prélèvement spécifique vers le laboratoire d'expertise. Prévoir tout de même un prélèvement distinct à envoyer au CTQ.**

Procédure d'envoi du prélèvement au CTQ

À l'intention des cliniciens :

Urine : 1^{er} choix de prélèvement

- Analyse à demander : Dépistage **LC-MSMS**
- Indiquer sur la requête « **Enquête surdose Estrie** »
- Prélèvement : pot de culture d'urine en plastique sans préservatif
- Réfrigérer le spécimen à 4 degrés
- Quantité minimale requise : 2 ml

Sang : si urine impossible

- Tube lavande (EDTA)
- Quantité minimale requise : 2 ml
- Inverser immédiatement le tube de sang total de 8 à 10 fois afin de bien mélanger l'anticoagulant
- Centrifuger le prélèvement et décanter le plasma dans un tube en polypropylène
- Réfrigérer le spécimen à 4 degrés pour un maximum de 30 jours

SVP, veuillez privilégier les expéditions groupées en début de semaine

Important : Toutes les informations doivent être inscrites sur la requête afin que le spécimen ne soit pas rejeté

Adresse d'expédition : Centre de toxicologie du Québec
Direction de santé environnementale et toxicologique
Institut national de santé publique du Québec
945, avenue Wolfe, 4^e étage
Québec (Québec) G1V 5B3