

ADMINISTRATION - REBYOTA®

AIDE-MÉMOIRE – 2026-05

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS (DSI)

INDICATION

Le Rebyota® est une préparation de microbiote fécal humain indiquée dans la prévention de la récurrence de l'infection à *Clostridioides difficile* (ICD) chez l'adulte ayant déjà reçu des traitements antibiotiques pour une ICD récurrente.

VALIDATION PRÉ-PROCÉDURE

- Lire la MSI d'administration d'un lavement rectal si la technique est peu ou pas connue.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage et la date de péremption (vient dans un sac opaque).
- La préparation se conserve jusqu'à 5 jours au réfrigérateur, incluant le temps nécessaire à la décongélation (24 heures au réfrigérateur).
- Informez l'usager ou l'usagère qu'il doit terminer son traitement antibiotique comme indiqué avant l'administration de REBYOTA®. Ce traitement ne remplace pas leur traitement antibiotique pour leur ICD.
- Administrer une dose de REBYOTA® de 24 à 72 heures après la dernière dose d'antibiotique pour l'ICD. Ne pas administrer pendant l'antibiothérapie pour l'ICD.
- Demander à l'usager ou l'usagère de vider sa vessie et si possible d'aller à la selle. Si présence de diarrhée ou douleur abdominale, prévenir le médecin traitant.
- Contrôler les signes vitaux.

EFFETS INDÉSIRABLES

Prévenir l'usager ou l'usagère des effets indésirables potentiels avant l'administration de la médication.

- Douleurs abdominales
- Distension
- Nausées
- Diarrhées
- Flatulences

Signaler et documenter tout symptôme sévère ou inhabituel.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Décongeler complètement Rebyota® au réfrigérateur (2 °C à 8 °C) pendant environ 24 heures si le produit est congelé. Le réfrigérateur utilisé pour la décongélation de Rebyota® ne doit pas contenir d'aliments ou de breuvages.



Ne pas décongeler à température ambiante. Ne pas utiliser de source de chaleur rapide pour la décongélation (ex : micro-ondes, eau chaude).



Mettre le Rebyota® dans un sac « Ziploc » au réfrigérateur, car contient des micro-organismes vivants (microbiote).


- Sortir le traitement du réfrigérateur maximum 15 minutes avant l'administration à l'usager ou l'usagère.
- Ne pas recongeler le produit après la décongélation

ADMINISTRATION - REBYOTA®

AIDE-MÉMOIRE – 2026-05

MATÉRIEL REQUIS

Matériel fourni : set d'administration (figure 1).






Matériel requis :

- Papier hygiénique ou mouchoir
- Gants non stériles
- Sac à déchets
- Bassin de lit **si nécessaire**
- Gel lubrifiant
- Piqué jetable x 2
- Solution hydro-alcoolique pour l'hygiène des mains
- Équipement de protection individuelle (ÉPI) obligatoire
 - Jaquette
 - Visière
 - Masque

PROCÉDURE D'ADMINISTRATION

- Ouvrez la trousse d'administration et fermez la pince en la poussant jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée (Figure 2).
- Retirez la languette de l'orifice du perforateur sur le sac contenant le REBYOTA® décongelé et enlevez le capuchon du perforateur du tube d'administration.
- Insérez le perforateur du tube d'administration dans l'orifice du perforateur du sac contenant le REBYOTA® décongelé (Figure 3).
 - Installer l'utilisateur en position latérale gauche ou genou-poitrine sur piqué jetable.
 - Avoir un piqué jetable supplémentaire proche en cas d'écoulement involontaire.
 - Lubrifier l'embout.
 - Introduire doucement le tube sur ~12 cm (vers le nombril).
- Maintenir le tube en place d'une main, ouvrir la pince et laisser couler par gravité (volume de 150 mL). Ne pas presser le sac ni le suspendre à une tige à soluté. (Figure 6).
- Mettre le sac environ 30 cm plus haut que l'utilisateur ou l'utilisatrice durant toute l'administration du traitement.
- À la fin de l'administration, **fermer la pince avant de retirer le tube** rectal.
- Retirer le tube après écoulement complet (une petite quantité peut être restée dans le tube).
- Jetez tous les éléments avec les déchets médicaux.





ADMINISTRATION - REBYOTA®

AIDE-MÉMOIRE – 2026-05

- Maintenir la position latérale gauche de l'utilisateur environ 15 min pour réduire l'apparition de crampe chez l'utilisateur post-traitement.
- Aucune restriction et protection quant à l'utilisation des toilettes par l'utilisateur ou l'utilisatrice.

APRÈS L'ADMINISTRATION

- Contrôler les signes vitaux et la douleur après la procédure.
- Documenter dans le dossier de l'utilisateur ou l'utilisatrice.
- Informer l'utilisateur ou l'utilisatrice des effets indésirables possibles (douleur abdominale, diarrhée, distension, gaz, nausées) et **recommander de consulter en cas de symptômes sévères**.
- L'utilisateur ou l'utilisatrice peut ensuite quitter l'établissement et reprendre ses activités normales.
- Informez l'utilisateur ou l'utilisatrice qu'il doit aviser son médecin traitant s'il présente une diarrhée persistante, définie comme l'émission de 3 selles molles ou plus sur une période de 24 heures pendant 2 jours consécutifs, après l'administration de REBYOTA®.
- L'utilisateur ou l'utilisatrice ne doit pas prendre d'antibiothérapie orale jusqu'à 8 semaines après l'administration de REBYOTA®, sauf avis contraire de son médecin, afin de ne pas détruire les nouvelles bactéries implantées dans l'intestin. Il est souhaitable **d'aviser le pharmacien communautaire** de l'utilisateur ou l'utilisatrice de cette précaution, afin qu'il puisse exercer la vigilance nécessaire.

Nettoyage standard du local. **En cas de fuite importante, faire une désinfection contact +.**

Le personnel soignant doit se laver les mains après le retrait des équipements de protection individuelle.



Contact avec la peau :

Retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau. En cas d'éruption cutanée, de plaie ou de toute autre irritation cutanée, consulter un médecin.



Contact avec les yeux :

Ne pas frotter les yeux. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant un maximum de 15 minutes. Retirer les lentilles cornéennes, le cas échéant, et maintenir les paupières bien ouvertes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.



ADMINISTRATION - REBYOTA®

AIDE-MÉMOIRE – 2026-05

RÉFÉRENCES

Administration d'un médicament par voie rectale | MSI : <https://msi.expertise-sante.com/fr/methode/administration-d-un-medicament-par-voie-rectale>

Rebyota® (microbiote fécal, vivant) – Monographie de produit. Montréal (QC) : Vigilance Santé; 2025. Disponible à : <https://cdn.vigilance.ca/mc/q8141641.pdf>. Consulté le 10 septembre 2025.

Ferring Pharmaceuticals Inc. *Full Prescribing Information: REBYOTA™ (fecal microbiota, live-jslm) suspension for rectal use* [Internet]. Revised November 2022. Parsippany (NJ). Disponible à : https://www.ferringusa.com/wp-content/uploads/sites/12/2022/12/9009000002_REBYOTA-PI_11-2022.pdf. Consulté le 10 septembre 2025.

Rédaction :

Samia Merkhi, CCC - Trajectoire Périopératoire et plateaux techniques spécialisés – DSI

Annie Davignon, ASI, médecine de jour de BMP – DSSCC

Révision:

Mélanie Gilbert, pharmacienne DSMP (05-2026)

Comité d'antibiogouvernance du CIUSSS de l'Estrie-CHUS (05-2026)

