

## PROCÉDURES INTERVENTIONNELLES OFFERTES EN CLINIQUE DE DOULEUR 2<sup>E</sup> LIGNE CIUSSSE-CHUS

Procédures interventionnelles*	Disponibilité*		
	Sherbrooke Hôpital Fleurimont	La Pommeraie Hôpital BMP	Haute-Yamaska, Hôpital de Granby
Bloc de la chaîne sympathique (ex. stellaire, lombaire, coeliaque, hypogastrique et ganglion impar)	X	X	X
Bloc d'un nerf périphérique (ex. nerfs intercostal, grand et petit nerf occipital /nerf d'Arnold, nerf fémoro-cutané, nerf honteux)	X	X	X
Bloc facettaire	X	X	X
Bloc nerf trijumeau (proximal et distal)		X	
Bloc paravertébral	X	X	X
Bloc plexique (cervical et lombaire)	X	X	X
Bloc de paroi	X	X	X
Bloc veineux/ bloc type Bier	X	X	X
Blocs diagnostic et neurolyse des nerfs géniculaires	X	X	X
Blood patch (injection de sang autologue en épidurale)	X	X	X
Cathéter épidural implanté (ex. pour patient avec cancer)	X	X	
Injection d'une articulation (2 <sup>e</sup> ligne : ne peut pas être la raison de consultation)	X	X	
Injection de muscles cibles	X	X	X
Injection épidurale caudale (avec imagerie)	X	X	X
Injection épidurale caudale (sans imagerie)	X	X	X
Injection épidurale foraminale cervicale (racine)	X	X	X
Injection épidurale foraminale lombaire et thoracique	X	X	X (lombaire seulement)
Injection épidurale interlaminaire lombaire, thoracique et cervicale (avec imagerie)	X	X	X
Injection épidurale interlaminaire lombaire et thoracique (sans imagerie)	X	X	X
Injection sacro-iliaque	X	X	X
Neurolyse chimique (ex. pour patients avec cancer)	X	X	X
Perfusion kétamine	X	X	X
Perfusion lidocaïne		X	X
Points gâchettes	X	X	X
Radiofréquence pulsée	X	X	X
Tests diagnostiques et Thermolésion	X	X	X

\*Sous réserve de modifications