

PRÉPARATION PRÉ-PROCÉDURE COLOSCOPIQUE (ADULTE)

DIRECTION DES SERVICES SPÉCIALISÉS, CHIRURGICAUX ET DE CANCÉROLOGIE

Approuvé par le Comité médical d'endoscopie CIUSSSE-CHUS - 23 janvier 2025

Modifié : 28 octobre 2025

COLOSCOPIE COURTE ou ÉCHO-ENDOSCOPIE RECTALE

- Diète normale
- 2 lavements Fleet™ Phosphate (1^{er} = 60 minutes et 2^e = 30 minutes avant la coloscopie)

Référez l'utilisateur aux dépliants :

Coloscopie courte ou Écho-endoscopie rectale et Lavement pour coloscopie courte

COLOSCOPIE LONGUE

- Diète : sans fibres 5 jours avant la coloscopie, liquides clairs à partir du matin la veille de la coloscopie puis à jeun 6 heures avant la procédure.
- S'il y a histoire de mauvaise préparation ou de constipation chronique (moins d'une selle aux 3 jours)
 - PEG (Relaxa™, Lax-A-Day™, Restoralax™) 17g BID po x 5 jours avant la préparation intestinale
 - Bisacodyl 3 co de 5 mg po à 14 h la veille de la coloscopie
 - Choisir la préparation intestinale PEG 4L divisé en 2 temps.

- Choisir la préparation intestinale de l'utilisateur soit Bi-PegLyte™ ou GoLyte™ ou Pico-Salax™ :

DANS LE DOUTE SUR LE CHOIX DE LA PRÉPARATION ; DONNER PEG 4 Litres.

Bisacodyl-PEG 2L (Bi-PegLyte™/JAMPLYte+Bisacodyl™)	PEG 4L (GoLyte™ / CoLyte™ / JAMPLYte™)	Pico-Salax™ / KleanLyte™
L'utilisateur : <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Est capable de marcher pendant la période de prise de la préparation.<input type="checkbox"/> Ne prend AUCUN médicament : antidépresseur, antipsychotique, narcotique ou agoniste GLP1.<input type="checkbox"/> ABSENCE d'obésité significative (a un IMC de moins de 30).<input type="checkbox"/> ABSENCE de diabète.<input type="checkbox"/> ABSENCE de maladie sévère ou limitant sérieusement sa vie ou de trouble neurologique dégénératif.	L'utilisateur : NE RÉPOND PAS aux critères du Bisacodyl-PEG 2L ET/OU (si indication connue) Aura une procédure coloscopique pour retrait de polypes / lésions OU pour un dépistage de dysplasie chez l'utilisateur avec une maladie inflammatoire de l'intestin (MII).	Si INTOLÉRANCE au PEG 4L ET avec fonction cardiaque et rénale normale
Bisacodyl 3 co de 5 mg po à 14 h la veille de la coloscopie Préparation à 18 h la veille (1L) et 4 h avant la procédure (1L)	Préparation à 18 h la veille (2L) et 4 h avant la procédure (2L)	Préparation à 18 h la veille et 4 h avant la procédure. * Respecter un 10-12 h entre les 2 doses.

HORAIRE ALTERNATIF pour le Bisacodyl-PEG 2L et PEG 4L
préparation le jour même possible si coloscopie après 13 h

- Bisacodyl 3 co de 5 mg po à 6h le matin (avec Bi-Peglyte™)
- Préparation de PEG (1L) ou de PEG (2L) à 7h le matin et répéter 4h avant la procédure.

- **ADJUVANT** (si aucune contre-indication et volonté de l'utilisateur)
 - Siméthicone 2 co de 125 mg po, 15 minutes avant chacune des doses de la préparation.
- Si **NAUSÉES** pendant la prise de la préparation :
 - Graval PO ou IR 50 mg aux 6 heures PRN, si nausées avec la préparation.
- **Modifications supplémentaires** (selon le profil pharmacologique de l'utilisateur)
 - FER : Cessez 7 jours avant la coloscopie
 - GLP1 (po ou sc) : Cessez 7 jours avant la coloscopie
 - ANTICOAGULANT : S'assurer que la gestion soit effectuée (Rx, ordonnance collective, MD référent...)

Si usager diabétique : Ne doit pas prendre hypoglycémiant ou insuline le jour de la coloscopie.

Référez l'utilisateur aux dépliants : Coloscopie longue, Préparation – 2 temps (Bi-PegLyte™ / GoLyte™ / Pico-Salax™), Horaire alternatif et/ou Coloscopie pour une personne diabétique de type 2

[SANTEESTRIE.QC.CA/SOINS-SERVICES/SPECIALISES/EXAMENS-OU-TESTS](https://santeestrie.qc.ca/soins-services/specialises/examens-ou-tests)

Section : Endoscopie digestive et pulmonaire

