

FER INTRAVEINEUX

POURQUOI MON MÉDECIN M'A-T-IL PRESCRIT CE MÉDICAMENT?

Ce médicament est généralement utilisé pour traiter ou prévenir l'anémie. Celle-ci se produit lorsque les réserves de fer de l'organisme sont insuffisantes. Le fer est essentiel à la production des globules rouges qui servent au transport de l'oxygène à toutes les parties du corps. Le fer vous sera administré dans une veine et l'administration sera d'environ 1 heure 30. Entre vos traitements, et à la fin de ceux-ci, vous devrez effectuer des prises de sang afin de vérifier si ces derniers ont été efficaces. Ce médicament vous sera administré jusqu'à ce que votre niveau de fer soit suffisant.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES DU FER INTRAVEINEUX?

Le fer intraveineux (Venofer et Monoferric) est un médicament sécuritaire et généralement bien toléré. Mais comme tout médicament, des effets indésirables peuvent survenir, à l'occasion, lors de l'administration ou après. Les tableaux ci-dessous présentent des symptômes pouvant survenir, la fréquence à laquelle ils ont été observés ainsi que les mesures à prendre.

EFFETS INDÉSIRABLES DURANT LA PERFUSION

Réactions	Fréquence	Mesures à prendre
Bouffées de chaleur	1%	Aviser le personnel infirmier, la perfusion sera arrêtée temporairement et les symptômes s'estomperont complètement simplement avec l'arrêt du traitement pendant quelques minutes. Le traitement pourra ensuite être repris.
Douleur à la poitrine		
Pression thoracique		
Nausées/vomissements	5%	Aviser le personnel infirmier, la vitesse d'administration pourra être réduite pour diminuer les symptômes.
Douleurs abdominales (maux de ventre)		
Démangeaisons	Rare	Ces symptômes sont ceux d'une réaction allergique, aviser le personnel infirmier, la perfusion sera cessée.
Éruption cutanée (rougeur, petits boutons)		
Difficulté respiratoire		
Enflure au visage		

EFFETS INDÉSIRABLES APRÈS LA PERFUSION

Réactions	Fréquence	Mesures à prendre
Goût métallique dans la bouche	8%	Mâcher des pastilles de menthe et essayer différents aliments pour masquer le goût métallique. Cet effet indésirable s'estompera après quelques jours.
Nausées/vomissements	5%	S'assurer de demeurer bien hydraté. Ces effets disparaîtront après quelques jours.
Douleurs abdominales (maux de ventre)		
Diarrhée		
Maux de tête	Entre 5 et 10%	Pour atténuer ces symptômes, prenez de l'acétaminophène. Ces symptômes durent entre 24 et 72 heures.
Frissons/fièvre		
Douleurs articulaires ou musculaires		
Étourdissement/faiblesse	3%	Ces symptômes s'estomperont après quelques jours.
Engourdissements	6%	
Difficulté respiratoire	Rare	Consulter immédiatement à l'urgence.
Enflure au visage		
Démangeaisons	Rare	Consulter un professionnel de la santé rapidement.
Éruption cutanée (rougeur, petits boutons)		

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Info-Santé 811

Consultez votre prescripteur ou votre pharmacien.

Rédaction

Équipe pharmacie, Direction des services professionnels

Révision et mise en page

Service des communications et des relations médias

Présidence-direction générale

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

santeestrie.qc.ca

Mars 2024 – 4-6-12023 (version française) | 4-6-12024 (version anglaise)