



# PRÉCAUTION | ANALYSE DU DOSAGE DE LA PROSTAGLANDINE D2 OU E2 URINAIRE

Ce test permet de dépister certains problèmes de santé ou certaines maladies, en plus de vérifier le dosage de la prostaglandine dans vos urines.

## PRÉPARATION

La présence de certaines substances dans votre urine peut provoquer des résultats faussement élevés. Ainsi, **deux jours (48 heures) avant et le jour de la collecte d'urine, ne prenez pas les médicaments suivants : Aspirin®, indométacine, médicaments anti-inflammatoires.** Vous devez toutefois consulter votre prescripteur avant d'interrompre la prise de médicaments sur ordonnance.

## VOUS AVEZ DES QUESTIONS?



[santeestrie.qc.ca/prelevements](https://santeestrie.qc.ca/prelevements)



Info-Santé 811  
OU  
Consultez votre prescripteur.

### Rédaction

Équipe de médecine de laboratoire

### Approbation

Dr François Goyer, biochimiste

### Révision et mise en page

Service des communications

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2020

Code de gestion documentaire | INS-CP-3097-FR

[santeestrie.qc.ca](https://santeestrie.qc.ca)

Juin 2023 – 1-6-72034 (version française) | 1-6-72035 (version anglaise)

**Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de l'Estrie – Centre  
hospitalier universitaire  
de Sherbrooke**

**Québec** 