

# EXTRAVASATION D'UN AGENT ANTINÉOPLASIQUE CHEZ L'ENFANT

Conservez ce document tant que l'extravasation de votre enfant n'est pas résolue.

## SOINS À PRODIGUER À VOTRE ENFANT À LA MAISON ET CONSEILS D'USAGE EN PRÉSENCE D'EXTRAVASATION

Lors de l'administration du traitement de votre enfant le \_\_\_\_\_ (date), il s'est produit une fuite hors de la veine d'un médicament nommé \_\_\_\_\_ (nom du médicament). C'est ce qu'on appelle une extravasation.

Afin de diminuer l'inconfort ou l'irritation, voici quelques conseils à suivre :

Appliquez une **compresse sèche froide** sur l'endroit indiqué par l'infirmière.

Nombre de jours : \_\_\_\_\_

Fréquence : 4 fois par jour (matin, midi, heure du souper et fin de soirée)

Durée : laissez la compresse sèche en place 20 à 30 minutes.

La compresse doit être froide et sèche. Vous pouvez mettre de la glace dans un sac de plastique étanche de type Ziploc<sup>MD</sup>, utiliser un accumulateur de froid (*ice pack*) ou un sac de petits pois surgelés. Il faut recouvrir l'objet d'une serviette sèche afin que la peau de votre enfant ne soit pas en contact direct avec le froid ou l'humidité.

Appliquez une **compresse sèche tiède** sur l'endroit indiqué par l'infirmière.

Nombre de jours : \_\_\_\_\_

Fréquence : 4 fois par jour (matin, midi, heure du souper et fin de soirée)

Durée : laissez la compresse sèche en place 20 à 30 minutes.

La compresse doit être tiède et sèche. Vous pouvez faire chauffer au four à micro-ondes une débarbouillette humide ou une compresse thérapeutique de type Sac magique<sup>MD</sup> pendant quelques secondes. Vous pouvez aussi mettre une débarbouillette imbibée d'eau tiède dans un sac de plastique étanche de type Ziploc<sup>MD</sup>.

N'appliquez **aucune** compresse sur la peau de votre enfant.

Appliquez le **DMSO** selon les directives de la fiche d'information à l'intention de l'utilisateur fournie par l'infirmière.

Une infirmière du centre d'oncologie pédiatrique vous appellera pour assurer un suivi.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. Autant que possible, votre enfant ne doit pas frotter ni gratter le site affecté.
2. Après une douche, séchez doucement la peau de votre enfant en épongeant le site affecté. Ne pas frotter.
3. Si votre enfant prend un bain, évitez de faire tremper le site affecté dans l'eau. Si cela devait arriver, rincez sous l'eau propre courante et épongez doucement pour assécher.
4. N'appliquez pas de lotion, de crème ou d'onguent sur le site affecté sans en avoir parlé à l'infirmière.
5. Le site affecté ne doit pas être exposé au soleil.
6. Votre enfant ne doit rien porter qui pourrait irriter ou causer de la friction au site affecté :
  - Les vêtements qui occasionnent un serrement au site affecté;
  - Des manches élastiques, une montre ou un bracelet si le site affecté est localisé au bras ou à la main ;
  - Des bretelles si le site affecté est localisé au thorax.
7. Si l'extravasation est localisée au bras de votre enfant, il faut garder (autant que possible) le bras légèrement surélevé et le faire bouger souvent. Et cela pour une durée de 48 heures.

## QUAND CONSULTER

Communiquez avec l'infirmière du centre d'oncologie pédiatrique dans les plus brefs délais si vous observez chez votre enfant :

- Augmentation ou apparition de douleur
- Augmentation ou apparition de rougeur
- Apparition de démangeaison
- Présence d'une lésion cutanée (ampoule)
- Rupture de la peau
- Présence d'un écoulement
- Enflure
- Difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras ayant subi l'extravasation

Avisez l'infirmière du centre d'oncologie pédiatrique et présentez-vous avec votre enfant à l'urgence si vous observez chez votre enfant :

- Fièvre de 38,3 °C (101 °F) une fois.

OU

- Fièvre de 38 °C (100,4 °F) deux fois à une heure d'intervalle.

Signature de l'infirmière : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

No. de téléphone et poste téléphonique : \_\_\_\_\_

### Rédaction

Direction des soins infirmiers

Adapté du Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques de l'INESSS, avril 2019.

### Révision et mise en page

Service des communications

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2021

santeestrie.qc.ca

Février 2022 – 4-6-11202 (version française) | 4-6-11203 (version anglaise)