



DIMÉTHYLSULFOXYDE (DMSO) - ADULTE

Ce médicament vous été prescrit pour diminuer les dommages possibles pouvant être causés par la chimiothérapie qui a fui hors de votre veine et qui s'est retrouvée sous votre peau. C'est ce qu'on appelle une extravasation.

MODE D'EMPLOI DU DMSO

Appliquez _____ fois par jour (aux _____ heures) pour _____ jours.

Après avoir appliqué votre compresse sèche froide :

1. Asséchez bien votre peau en épongeant délicatement.
2. Mettre des gants de type chirurgical.
3. Appliquez _____ gouttes de DMSO.
4. Étendez le DMSO sur le double de la surface atteinte à l'aide d'un applicateur à bout de coton et tige de bois.
5. Laissez sécher à l'air libre (ne pas couvrir d'un pansement).

ENTREPOSAGE

Gardez hors de la portée des enfants.

Conservez le DMSO dans son contenant de verre à la température de la pièce.

REMARQUES

Le DMSO peut endommager le plastique ou les tissus synthétiques.

Pour usage externe seulement.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

- Irritation locale
- Peau sèche ou qui pèle
- Démangeaison
- Picotement
- Rougeur
- Sensation de chaleur au site d'application
- Haleine avec une odeur d'ail
- Maux de tête
- Nausées
- Somnolence
- Étourdissements

QUAND CONSULTER

Vous devez contacter l'infirmière du centre de chimiothérapie dans les plus brefs délais si vous observez :

- Augmentation ou apparition de douleur
- Augmentation ou apparition de rougeur
- Apparition de démangeaison
- Présence d'une lésion cutanée (ampoule). Dans ce cas, suspendre l'application de DMSO
- Rupture de la peau
- Présence d'un écoulement
- Enflure
- Difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras ayant subi l'extravasation

Avisez l'infirmière du centre de chimiothérapie et présentez-vous à l'urgence si vous observez :

- Fièvre de 38,3 °C (101 °F) une fois.

OU

- Fièvre de 38 °C (100,4 °F) deux fois à une heure d'intervalle.

Signature de l'infirmière : _____

Date : _____

No. de téléphone et poste téléphonique : _____

Rédaction

Direction des soins infirmiers

Adapté du Guide de prise en charge de l'extravasation des agents
antinéoplasiques de l'INESSS, avril 2019.

Révision et mise en page

Service des communications

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2021

santeestrie.qc.ca

Février 2022 – 4-6-11196 (version française) | 4-6-11197 (version anglaise)