

# HYALURONIDASE (MÉDICAMENT) - ADULTE

Ce médicament vous a été prescrit pour diminuer les dommages possibles pouvant être causés par la chimiothérapie qui a fui hors de votre veine et qui s'est retrouvée sous votre peau. C'est ce qu'on appelle une extravasation.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

- Enflure au site d'injection
- Réaction allergique (éruption cutanée, démangeaison, gonflement autour des yeux)
- Irritation locale
- Infection
- Saignement
- Présence de bleus (ecchymoses)

Signature de l'infirmière :

\_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

No. de téléphone et poste téléphonique :

\_\_\_\_\_

## QUAND CONSULTER

Vous devez contacter l'infirmière du centre de chimiothérapie **dans les plus brefs délais** si vous observez :

- Augmentation ou apparition de douleur
- Augmentation ou apparition de rougeur
- Apparition de démangeaison
- Présence d'une lésion cutanée (ampoule)
- Rupture de la peau
- Présence d'un écoulement
- Enflure
- Difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras ayant subi l'extravasation

Aviser l'infirmière du centre de chimiothérapie et présentez-vous à l'urgence si vous observez :

- Gonflement autour des yeux.
- Fièvre de 38,3 °C (101 °F) une fois.

OU

- Fièvre de 38 °C (100,4 °F) deux fois à une heure d'intervalle.

### Rédaction

Direction des soins infirmiers

Adapté du Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques de l'INESSS, avril 2019.

### Révision et mise en page

Service des communications

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2021

santeestrie.qc.ca

Février 2022 – 4-6-11194 (version française) | 4-6-11195 (version anglaise)

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de l'Estrie – Centre  
hospitalier universitaire  
de Sherbrooke

Québec

