

HYALURONIDASE (MÉDICAMENT) - ENFANT

Ce médicament a été prescrit à votre enfant pour diminuer les dommages possibles pouvant être causés par la chimiothérapie qui a fui hors de la veine et qui s'est retrouvée sous sa peau. C'est ce qu'on appelle une extravasation.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

- Enflure au site d'injection
- Réaction allergique (éruption cutanée, démangeaison, gonflement autour des yeux)
- Irritation locale
- Infection
- Saignement
- Présence de bleus (ecchymoses)

Signature de l'infirmière :

Date : _____

No. de téléphone et poste téléphonique :

QUAND CONSULTER

Vous devez contacter l'infirmière du centre d'oncologie pédiatrique **dans les plus brefs délais** si vous observez :

- Augmentation ou apparition de douleur
- Augmentation ou apparition de rougeur
- Apparition de démangeaison
- Présence d'une lésion cutanée (ampoule)
- Rupture de la peau
- Présence d'un écoulement
- Enflure
- Difficulté à bouger la main, le poignet, le coude ou l'épaule du bras ayant subi l'extravasation

Avisez l'infirmière du centre d'oncologie pédiatrique et présentez-vous à l'urgence si vous observez :

- Gonflement autour des yeux.
- Fièvre de 38,3 °C (101 °F) une fois.

OU

- Fièvre de 38 °C (100,4 °F) deux fois à une heure d'intervalle.

Rédaction

Direction des soins infirmiers

Adapté du Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques de l'INESSS, avril 2019.

Révision et mise en page

Service des communications

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2021

santeestrie.qc.ca

Février 2022 – 4-6-11200 (version française) | 4-6-11201 (version anglaise)

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Estrie – Centre
hospitalier universitaire
de Sherbrooke

Québec

