



## CURIETHÉRAPIE À HAUT DÉBIT

### TRAITEMENT DE L'ŒSOPHAGE RECOMMANDATIONS DE FIN DE TRAITEMENT

### EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Le traitement continue à agir dans votre organisme même si vous avez terminé vos séances. Il se peut donc que certains effets secondaires apparaissent, persistent ou s'amplifient dans la semaine suivant votre dernier rendez-vous.

Les effets secondaires possibles sont :

- fatigue à la suite du traitement;
- inconfort, sensibilité ressentie au niveau de la région traitée pendant quelque temps;
- difficulté à avaler;
- douleur à l'œsophage;
- crachats légèrement teintés de sang.

### SIGNES DE COMPLICATIONS À SURVEILLER

Avisez l'équipe de curiethérapie immédiatement si les symptômes suivants se manifestent à la suite de votre traitement.

#### **Si vous n'avez pas de chimiothérapie :**

- fièvre supérieure à 38,3 °C pendant plus de 24 h (température par la bouche).

#### **Si vous avez de la chimiothérapie :**

- fièvre supérieure à 38,3 °C (température par la bouche);
- douleur au niveau de la région traitée qui persiste ou augmente;
- crachats avec saignements importants/caillots;
- tout autre symptôme qui vous inquiète.

### SUIVI

À la fin de vos séances de curiethérapie, votre radio-oncologue vous fixera un rendez-vous de suivi. Vous recevrez une lettre par la poste ou un appel téléphonique vous indiquant la date et l'heure du rendez-vous.



Vous pouvez joindre l'équipe de curiethérapie au 819 346-1110, poste 14602, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.



Si la clinique est fermée, appelez Info-Santé au 8-1-1.



Dans le cas d'une aggravation des symptômes énoncés précédemment, présentez-vous à l'urgence du centre hospitalier le plus proche.

#### **Auteur**

Service de radio-oncologie

#### **Révision et mise en page**

Direction des communications et des affaires publiques