



CURIETHÉRAPIE À HAUT DÉBIT | TRAITEMENT GYNÉCOLOGIQUE

La curiethérapie à haut débit est un traitement très localisé administré aux tissus malades. Il permet de déposer une dose de radiation à un endroit précis tout en préservant les tissus sains. La précision de ce traitement minimise les effets secondaires.

Une équipe spécialisée s'occupe de vous, soit les technologues en radio-oncologie, l'infirmière auxiliaire, le physicien et le médecin.

Le traitement n'est pas douloureux et ne nécessite pas d'hospitalisation. **À la fin du traitement, vous n'êtes pas radioactive et ne représentez aucun danger pour les personnes de votre entourage.**


COMMENT SE DÉROULE LE TRAITEMENT?

On installe d'abord un ou des applicateurs (*colpostats* ou cylindre) dans la région à traiter. Pour ce faire, vous êtes couchée sur le dos, en position gynécologique (pieds dans les étrières).

Une sonde urinaire est également installée pour la durée de votre traitement. Ce n'est pas douloureux, mais peut être inconfortable.

Vous êtes ensuite dirigée en radio-oncologie afin de passer un CT-scan. Cet examen permet d'obtenir des images radiologiques de la région à traiter. Une fois les images obtenues, le physicien et le médecin procèdent à la planification du traitement. Durant cette période, vous attendez dans une salle de repos, couchée sur une civière. Votre accompagnateur peut vous y rejoindre.

Lorsque la planification du traitement est terminée, vous êtes dirigée à la salle de traitement où le technologue branche le ou les cathéters à l'appareil. À la fin du traitement, le technologue retire le ou les cathéters et la sonde urinaire. Un membre de l'équipe s'assure de votre état général avant votre départ.



Colpostats



Cylindre

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE PRÉVOIR POUR UNE SÉANCE?

Vous êtes entre 2 et 3 heures en radio-oncologie, ce qui inclut :

- l'installation des applicateurs (20 à 30 minutes);
- le CT-scan;
- le temps d'attente (30 à 45 minutes);
- le traitement (5 à 30 minutes).

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES?

Il est important de noter que chaque personne réagit différemment et que ce ne sont pas toutes les patientes qui ont des effets secondaires. Les effets secondaires possibles sont :

- fatigue à la suite du traitement;
- pertes vaginales et/ou sanguines quelques jours suivant le traitement;
- diarrhée;
- sensation de brûlure lorsque vous urinez;
- sécheresse vaginale;
- sensibilité inhabituelle au niveau de la région traitée.

SIGNES DE COMPLICATIONS À SURVEILLER

Avisez l'équipe de curiethérapie immédiatement si les symptômes suivants se manifestent à la suite de votre traitement.

Si vous n'avez pas de chimio : fièvre supérieure à 38,3°C pendant plus de 24 h (température par la bouche).

Si vous avez de la chimio : fièvre supérieure à 38,3°C (température par la bouche);

- douleur au niveau de la région traitée qui persiste ou augmente;
- tout autre symptôme qui vous inquiète.

RECOMMANDATIONS À SUIVRE PENDANT MES TRAITEMENTS

- Utilisez un savon doux non parfumé (par exemple, la marque Dove) au niveau de la région traitée.
- Évitez de prendre des bains parfumés (bain moussant, gel douche parfumé, etc.).
- N'ayez pas de relations sexuelles pendant toute la durée des traitements.

RENSEIGNEMENTS



Vous pouvez joindre l'équipe de curiethérapie au 819 346-1110, poste 14602, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.



Si la clinique est fermée, appelez Info-Santé au 811.



Dans le cas d'une aggravation des symptômes énoncés précédemment, présentez-vous à l'urgence du centre hospitalier le plus proche.

Auteur : Service de radio-oncologie

© Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
chus.qc.ca

Février 2013 – 1-6-70975