



# FIN DE VOS TRAITEMENTS DE RADIOTHÉRAPIE STÉRÉOTAXIQUE | MÉTASTASE

Vous venez de terminer vos traitements de radiothérapie stéréotaxique. Les effets secondaires (douleur et fatigue) peuvent persister au cours des prochaines semaines et disparaîtront progressivement.

## EFFETS SECONDAIRES

- Inconfort ou douleur au site traité.
- Le radio-oncologue aura discuté avec vous avant le début des traitements des effets secondaires qui s'appliquent vraiment à votre situation.

La présence et la persistance de ces effets secondaires varieront selon votre situation et l'endroit exact où se situait votre cancer.

## RECOMMANDATIONS À SUIVRE POUR LA FIN DE VOS TRAITEMENTS

### Alimentation

Maintenez une alimentation équilibrée, basée sur le Guide alimentaire canadien.

### Retour aux activités quotidiennes

Reprenez progressivement vos activités normales.

### Dans le cas de complications ou d'aggravation des effets secondaires



Vous pouvez joindre l'équipe de radio-oncologie au 819 346-1110, poste 14602, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h.



Présentez-vous à l'urgence du centre hospitalier le plus proche.



Si la clinique est fermée, Appelez Info-Santé au 811.

### Auteur

Service de radio-oncologie de l'Hôpital Fleurimont

### Révision et mise en page

Service des communications

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

© Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2020

[santeestrie.qc.ca](http://santeestrie.qc.ca)

Janvier 2021 - 4-6-10581 (version française) | 4-6-10582 (version anglaise)

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de l'Estrie – Centre  
hospitalier universitaire  
de Sherbrooke

Québec